DOI: 10.3724/SP.J.1006.2008.00777

糜子 *SAMS* 基因的克隆及其在干旱复水中的表达模式分析

林凡云¹ 王士强¹ 胡银岗^{1,2,*} 何蓓如¹

(¹ 西北农林科技大学农学院, 陕西杨凌 712100; ² 陕西省农业分子生物学重点实验室, 陕西杨凌 712100)

摘要: 以糜子抗旱节水研究中获得的一个与 S-腺苷甲硫氨酸合成酶(SAMS)基因同源性较高的 EST 序列为基础, 采用 RT-PCR 技术从糜子中分离到一个 *SAMS* 基因的全长 cDNA 序列(命名为 *PmSAMS*), 全长 1 293 bp, 编码 396 个氨基酸, 具有 *SAMS* 典型的 N 端结构域、中间结构域及 C 端结构域。糜子、马铃薯、拟南芥、甜菜、大麦、荔枝、番茄和水稻 8 种植物 *SAMS* 的氨基酸序列多重比较分析表明, 不同植物的 *SAMS* 的氨基酸相似程度非常高(92%~97%), 其中糜子与水稻的相似性最高(97%), 说明 *SAMS* 基因在植物进化中非常保守。*PmSAMS* 基因在糜子幼苗干旱及复水过程中的半定量 RT-PCR 表达模式分析表明, 在干旱早期(土壤含水量 36%)诱导该基因大量表达, 而干旱程度更严重时(土壤含水量为 24%)其表达受到严重抑制, 表达量比对照还低; 严重干旱后复水 2 h, 其表达量增强至干旱早期的表达量, 而复水 6 h 后表达量降低至对照(干旱处理前)水平。可见, *PmSAMS* 基因的表达涉及糜子响应干旱胁迫及干旱后复水过程, 可能是糜子抗旱节水的关键词基因。该基因的克隆为进一步探讨其应用于农作物抗旱节水性状的遗传改良奠定了基础。

关键词: 糜子; S-腺苷甲硫氨酸合成酶; 干旱复水; 表达模式; 进化分析

Cloning of A *S*-Adenosylmethionine Synthetase Gene from Broomcorn Millet (*Panicum miliaceum* L.) and Its Expression during Drought and Re-Watering

LIN Fan-Yun¹, WANG Shi-Qiang¹, HU Yin-Gang^{1,2,*}, and HE Bei-Ru¹

(¹ College of Agriculture, Northwest A & F University, Yangling 712100, Shaanxi; ² Shaanxi Key Laboratory of Molecular Biology for Agriculture, Yangling 712100, Shaanxi, China)

Abstract: To explore more genes for the improvement of drought-tolerance and water use efficiency in plants, broomcorn millet (*Panicum miliaceum* L.) was used to investigate the differential gene expression during drought stress and re-watering after serious drought stress by constructing SSH-cDNA library in previous study. A full-length cDNA of *S*-adenosylmethionine synthetase (*SAMS*) gene was amplified from broomcorn millet using PCR. The PCR primers were designed based on an EST sequence highly similar to *SAMS* gene in the SSH-cDNA library and the sequences of *SAMS* genes from rice and barley. The full-length cDNA sequence of *SAMS* gene amplified from broomcorn millet was 1 293 bp in length and designated as *PmSAMS*, encoding 396 amino acids with the 3 typical domains of *SAMS* (N terminal domain, inter domain and C terminal domain). Multiple alignment analysis based on the amino acids encoded by some *SAMS* genes from broomcorn millet (*P. miliaceum* L.), potato (*S. tuberosum*), Arabidopsis (*A. thaliana*), sugar beet (*B. vulgaris*), barley (*H. vulgare*), litchi (*L. chinensis*), tomato (*L. esculentum*), and rice (*O. sativa*) indicated that *SAMS* was very conserved among different species of plants with 92–97% of sequence similarity of amino acids, and *PmSAMS* had the highest similarity with that of rice (97%). The expression patterns of *PmSAMS* during drought and re-watering after serious drought were investigated by means of semi-quantitative RT-PCR. The results showed that the expressions of *PmSAMS* were great at the beginning of drought treatment (soil relative moisture of 36%), then declined under serious drought (soil relative moisture of 24%) to less than the normal level, and increased at 2 h after re-watering, declined to the

基金项目: 西北农林科技大学科研基金面上项目(2006ZR013); 国家重点基础研究发展计划(973 计划)项目(2006CB708208)

作者简介: 林凡云(1975–), 女, 吉林白山人, 博士, 主要从事作物分子遗传育种研究, 现在江苏省农科院进行博士后研究。E-mail: fy_hw@yahoo.com.cn

* 通讯作者(Corresponding author): 胡银岗。E-mail: huyingang@yahoo.com.cn; huyingang@nwsuaf.edu.cn

Received(收稿日期): 2007-09-17; Accepted(接受日期): 2007-12-16.

normal level at 6 h after re-watering. The expression patterns of *PmSAMS* during drought and re-watering after serious drought indicated that it was involved in the response of broomcorn millet to drought and re-watering and might be one of the key genes for drought tolerance and water use efficiency of broomcorn millet. The cloning of this gene provides the potential for its utilization in the improvement of drought-tolerance and water use efficiency in other plants.

Keywords: Broomcorn millet; *S*-adenosylmethionine synthetase; Drought and re-watering; Express profile; Phylogenetic analysis

糜子是一种抗逆性很强的作物,具有耐旱、耐贫瘠等特点。它属C₄植物,光合速率较高,干物质积累快,水分利用效率高,在C₃植物完全停止干物质生产的水分条件下,仍能进行干物质生产。随着全球缺水形势的日益严峻,提高作物水分利用率,对作物的抗旱节水性进行遗传改良,已成为目前研究的一个热点。通过研究现有水分利用效率高的植物资源如糜子的抗旱节水机制,并从中挖掘新的基因资源来改良小麦、水稻、玉米等作物的水分利用效率是一条捷径。为了揭示糜子抗旱节水的分子基础,我们利用抑制减法杂交技术(SSH)构建了糜子在干旱胁迫后复水过程与干旱胁迫下的SSH-cDNA文库^[1-2]。通过分析发现,其中一个编码S-腺苷甲硫氨酸合成酶基因的EST序列在干旱及复水两种处理间差异表达。

S-腺苷甲硫氨酸合成酶(*S*-adenosylmethionine synthetase, SAMS, EC 2.5.1.6)催化甲硫氨酸和ATP反应生成S-腺苷甲硫氨酸(SAM),参与甲硫氨酸的生物合成,甲硫氨酸是乙烯及多胺的前体^[3],还是DNA、RNA、蛋白、脂及植物次生代谢物的甲基供体,是一种重要的中间代谢物质^[4-5]。目前,已有番茄、矮牵牛、烟草及盐地碱蓬等多种植物的SAMS基因被克隆^[6-9]。序列比对分析表明,这些基因的组成相对保守,主要由一个基因家族编码^[10]。研究表明SAMS基因受多种非生物胁迫诱导表达,余涛等^[8]在烟草中对两个SAMS基因的表达模式分析表明,SAMS1基因的表达受高温诱导增强,而SAMS2基因的表达同时受氧化胁迫、盐胁迫及高温胁迫的诱导。Gupta等^[11]的研究表明,白杨树SAMS基因受高浓度CO₂和O₃诱导表达。Ma等^[9]发现盐地碱蓬的SAMS2基因受NaCl、ABA及干旱胁迫的诱导。

本研究以从复水的SSH-cDNA文库中获得的糜子SAMS基因的EST序列为基础,以该EST序列、水稻及大麦SAMS基因序列的保守区设计引物,从糜子中克隆了SAMS基因的全长cDNA,并对其结构特点及其在干旱和复水过程中的表达模式等进行了初步分析,为进一步探讨糜子SAMS基因作为新的

抗旱节水基因利用的可行性研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 植物材料及处理

盆栽西北农林科技大学保存的糜子抗旱种质印度790051,幼苗生长期保持土壤相对含水量在(75±5)%。幼苗4叶期停止浇水,进行自然干旱处理,并分别在土壤相对含水量为75%、36%和24%时取样。当土壤相对含水量达到24%时,部分叶片已经卷曲,出现严重萎蔫现象,对幼苗进行复水处理,复水时采取上浇、下渗的方式,使其尽快恢复水分供应,分别于复水后2、6、12 h取样。对照正常浇水(土壤相对含水量保持在75%左右)。样品于液氮中速冻,-70℃保存备用。

采用称重法测定土壤相对含水量,土壤相对含水量(%)=(土壤实际含水量/土壤最大毛细管持水量)×100%。

1.2 方法

1.2.1 总RNA的提取及cDNA的合成 采用Trizol试剂盒(北京天根生化科技公司)提取总RNA,用AMV反转录酶(大连TaKaRa公司)合成cDNA第一链(参照说明书)。

1.2.2 半定量RT-PCR分析 根据获得的糜子与SAMS同源性较高的EST序列(GenBank收录号DW177307),利用DNAMAN 5.2.2设计半定量RT-PCR分析引物,正向引物为5'-GCTGCCAAGAGCATTGTT-3',反向引物为5'-TGATAAGCGTGACAGACCA-3'。以糜子组成型表达的*actin*基因作为调整模板的内参(正向引物为5'-ACCGAAGCCCC TCTTAACCC-3',反向引物为5'-GTATGGCTGACACCATCACC-3',参照文献[12])。PCR反应程序为95℃预变性3 min;95℃40 s,55℃45 s,72℃40 s,35个循环;72℃延伸8 min,4℃保温。

1.2.3 糜子SAMS基因的全长cDNA克隆 根据水稻(AJ495786)及大麦的SAMS基因序列(CAJ01705)设计一条兼并引物5'-AGATGGCYGMASTTGAWACC-3',根据已分离的糜子SAMS基因的EST序列

(DW177307)设计反向引物 5'-TGAGGTCCACCGA TGACAAA-3'), 以糜子 cDNA 为模板分离糜子的全长 *SAMS* 基因。PCR 反应程序为 95℃ 预变性 3 min; 95℃ 40 s, 55℃ 40 s, 72℃ 90 s, 35 个循环; 72℃ 延伸 8 min, 4℃ 保温。

用 Agarose Gel DNA Purification Kit(大连 TaKaRa 公司)试剂盒回收目标片段, 并与 pGEM-T Easy 载体(Promega, USA)连接, 转化感受态大肠杆菌 JM109, 用蓝白斑筛选结合 Sp6 和 T7 引物菌落 PCR 筛选阳性克隆。用 Sp6 和 T7 引物进行双向测序(上海英骏生物技术有限公司)。将所测序列与已知糜子与 *SAMS* 基因同源性较高的 EST 序列拼接后获得糜子 *SAMS* 基因的全长 cDNA 序列。

1.2.4 序列的生物信息学分析 利用 NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov)的 BLAST 在线分析工具分别对 GenBank 的非冗余核酸数据库和非冗余蛋白数据库序列进行比对分析。采用 NCBI(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>)的 ORF finder 预测开放阅读框,采用 WoLF PSORT 软件(<http://wolfsort.seq.cbrc.jp/>)在线进行亚细胞定位分析, NCBI 的 Blastp 进行蛋白序列保守结构域分析,采用 ExPASy 网站的 Compute pI/MW tool (http://www.expasy.org/tools/pi_tool.html)计算蛋白质的等电点及分子量。采用 DNAMAN5.2.2

(Lynnon Biosoft Corp.)进行序列多重比较及系统进化树构建。

2 结果与分析

2.1 糜子 *SAMS* 基因的克隆及分析

前期实验分离到与 *SAMS* 基因具有较高同源性的 EST 序列(DW177307)长 576 bp, 位于该基因的 3' 端。根据水稻及大麦 *SAMS* 基因序列设计一条简并的上游引物, 根据 DW177307 设计下游引物, 以糜子叶片 cDNA 为模板, RT-PCR 扩增到一个 741 bp 的片段, 经克隆测序后, 获得了糜子 *S*-腺苷甲硫氨酸合成酶基因的 5' 序列, 将该序列与 DW177307 拼接获得 1 293 bp 的糜子 *S*-腺苷甲硫氨酸合成酶基因的全长 cDNA, 命名为 *PmSAMS*。该序列的最大读码框为 1 188 个核苷酸, 编码 396 个氨基酸(图 1)。软件预测结果表明, 该蛋白的等电点为 5.50, 分子量为 43 243.02 Da, 定位在细胞骨架里。结构域分析表明该编码蛋白具有 *S*-腺苷甲硫氨酸合成酶典型的 N 端结构域、中间结构域和 C 端结构域(图 2)。

2.2 不同植物 *SAMS* 基因的多重比较

马铃薯(*S. tuberosum*, DQ235185)、拟南芥(*A. thaliana*, AC007138)、甜菜(*B. vulgaris*, AB221010)、大麦(*H. vulgare*, AM039896)、荔枝(*L. chinensis*,

1 ATGCTGAAGTTGAAACCTTCTCTTCACTCCGGAGTCTGTGAACGAGGGGACACCCGTGCAAGCTCTGCGATCAAGTCTCAGATGCCGCTG
H A E V E T F L F T S E S V N E G H P D K L L C D Q V S D A V

91 CTCGACGCTTGCTTGTGAGGACCTGACAGCAAGGTTCTCTTCGAGACATGCAACCAAGCATGCTGCTATGGTCTTTGGTGAGATG
L D A C L A E D P D S K V P C E T C T K T N M V M V F G E I

181 ACCACCAAGGCCAATGTCGACTACGAGAAGATTGTTCAGGGAGACTTGGCGCAACATTGGTTTCGTGTCAGCAGATGTTGGGCTTGACCGT
T T K A N V D Y E K I V R E T C R N I G F V S A D V G L D A

271 GACCACTGCAAGGTGCTCGTGAACATTGAGCAGCAGTCCCTGATATTGCTCAGGGTGTGCATGGTCACTTCACAAAGCGCCCTGAGGAG
D H C K V L V N I E Q Q S P D I A Q G V H G H F T K R P E E

361 ATTGGAGCTGGTGACCAAGGACACTGTTTGGGTATGCGCACTGATGAACCCCTGAGCTGATGCGCCCTCAGGCATGTCTTGCACCAAG
I G A G D Q G H M F G Y A T D E T P E L M P L S H V L A T K

451 CTTGTGCTCGCCTCACTGAGGTGGCGCAAGAACGGGACCTGCCCTGGCTCAGGCCTGATGGAAAGACCCAGGTGACTGTTGAGTACCGC
L G A R L T G T V E R K N G T C P W L R P D G K T Q V T V E Y R

541 AATGAGGTGGTGCCATGGTCCCATCCGCGTCCACACTGTCTCTCTACCCAGCAGCAGCAGCAGTACCCAAAGCATGAGATTGCC
N E G G A M V P I R V H T V L I S T Q H D E T V T N D E I A

631 GCTGACCTCAAGGAGCAGCTCATCAAGCCTGTCACTCCCTGAGCAGTACCTTGATGAGAAGACCATCTTCCACCTTAACCCATCTGGTTCG
A D L K E H V I K P V I P E Q Y L D E K T I F H L N P S G R

721 TTTGTCACTGGTGGACCTCATGTTGATGCTGGTCTCACTGGCGGGAAGATCATCATTGATACCTATGGTGGCTGGGGAGCCACGGTGGT
F V I G G G P H A A G D A G L L T G R K I I I D T Y G G A G C A H G G

811 GGTGCTTTCTTGGCAAGGACCCGACCAAGGTGACCGCAGTGGAGCCTACATTGCAAGGCAGGCTGCCAAGGCATATTGTTGCTAACGGC
G A F S G K D P T K V D R S G A Y I A R K A A K S I V A N G

901 CTTGCTCGCGCGCCATCGTCCAGGCTCTCTACGCCATTGGTGTGCCAGAGCCGCTCTCCGTGTTTGTGGACACTACGGCACTGGCAG
L A R R A I V Q V S Y A I G V P E P L S V F T V D T Y G T A G

991 ATCCCGACAAGGAGATCTCTCAAGATTGTGAAGGAGAACCTTTGACTTCAGGCCTGGCATATCATCAACCTCGACCTCAAGAAAGGT
I P D K E I L K I V K E N F D R F P G M I I I N L D L K K G

1081 GGCAACGGGCGCTACCTTAAAGACAGCGGCTACGGTCACTTCGGAAGGGATGACCCGTGACTTCACCTGGGAGGTGGTGAAGCCCTCAAG
G G N G R Y L K T A A Y G H F G R D P D F T W E V V K P L K

1171 TGGGAGAAGCCTTCTGCCCTAA
M E K P S A *

图 1 糜子 *SAMS* 基因的编码区及推导的氨基酸序列

Fig. 1 The coding region and deduced amino acid sequences of *PmSAMS*

图 2 糜子 *SAMS* 基因的保守区分析
Fig. 2 Conserved domains of *PmSAMS*

AY259227)、番茄(*L. esculentum*, Z24742)、水稻(*O. sativa*, AJ296743)及糜子(*P. miliaceum*) 8 种植物的 *SAMS* 基因的氨基酸序列的多重比较(图 3)表明, 不同植物 *SAMS* 基因的相似程度非常高。

系统进化树分析(图 4)显示, 这 8 种植物的 *SAMS* 基因氨基酸序列相似性非常高, 在 92%~97% 之间, 其中, 糜子与水稻的相似性最高, 达 97%, 说

明该基因在植物的进化中非常保守。

2.3 糜子 *SAMS* 基因的表达模式分析

利用半定量 RT-PCR 对 *PmSAMS* 基因在不同水分处理条件下的糜子叶片中的表达进行了分析, 并利用 GeneSnap 软件分析了其相对表达量(图 5)。半定量 RT-PCR 结果表明 *PmSAMS* 基因的大量表达受干旱和复水的诱导。*PmSAMS* 在糜子正常生长(土壤

<i>A. thaliana</i>	---METFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	77
<i>B. vulgaris</i>	---METFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	77
<i>L. esculentum</i>	---METFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	77
<i>L. chinensis</i>	---METFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	77
<i>S. tuberosum</i>	---METFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	77
<i>H. vulgare</i>	MAEVETFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	80
<i>O. sativa</i>	MAALDTFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	80
<i>P. miliaceum</i>	MAEVETFLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	80
Consensus	TFLLFTSESVNEGHDPKLCDCQSDAVLDALEQDPDSKVACETCTKTNNMVMVFGIEITTKATDYEKIVRDTCSRIG	
<i>A. thaliana</i>	FISDDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	157
<i>B. vulgaris</i>	FISDDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	157
<i>L. esculentum</i>	FVSPDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	157
<i>L. chinensis</i>	FISDDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	157
<i>S. tuberosum</i>	FVSPDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	157
<i>H. vulgare</i>	FVSPDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	160
<i>O. sativa</i>	FVSPDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	160
<i>P. miliaceum</i>	FVSPDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	160
Consensus	FISDDVGLDADCKKVLVNIQQSPDIAQGVHGHFTRKPEEIGAGDQGHMFGYATDETPELMPLSHVLATKLGARLTVRKK	132
<i>A. thaliana</i>	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	237
<i>B. vulgaris</i>	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	237
<i>L. esculentum</i>	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	237
<i>L. chinensis</i>	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	237
<i>S. tuberosum</i>	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	237
<i>H. vulgare</i>	NATCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	240
<i>O. sativa</i>	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	240
<i>P. miliaceum</i>	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	240
Consensus	NGTCFPLRPDQGTQVTVETVNDNGAMVPRVHTVLISTQHDDETVDNDEIAADLKEHVIKPVIPEKYLDDEKTIHFLNPSGR	195
<i>A. thaliana</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	317
<i>B. vulgaris</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	317
<i>L. esculentum</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	317
<i>L. chinensis</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	317
<i>S. tuberosum</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	317
<i>H. vulgare</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	320
<i>O. sativa</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	320
<i>P. miliaceum</i>	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	320
Consensus	FVIGGPHGDAGLTGRKIIIDTYGGGAHGGGAFSGKDPTKVDRSGAYIVRQAASIVANGLARARIVQVSYAIGVPEPLS	268
<i>A. thaliana</i>	VFVDTYGTGLIPDKEILKIVKEIFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	393
<i>B. vulgaris</i>	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKEIFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	393
<i>L. esculentum</i>	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKENFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	393
<i>L. chinensis</i>	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKENFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	393
<i>S. tuberosum</i>	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKENFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	393
<i>H. vulgare</i>	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKENFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	396
<i>O. sativa</i>	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKENFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	396
<i>P. miliaceum</i>	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKENFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	396
Consensus	VFVDTYGTGKIPDKEILKIVKEIFDFRPGHIIINLDELKRGNGRFLKTAAYGHFGRDDPDFTEUVVKPLKWKPEA	324

图 3 8 种植物的 *SAMS* 氨基酸序列的多重比对
Fig. 3 Multiple alignment of *SAMS* from eight plants

图 4 8 种植物 SAMS 氨基酸序列的进化树

Fig. 4 Phylogenetic tree based on amino acid sequence of SAMS from eight plants

图 5 糜子 *SAMS* 基因在干旱胁迫和复水条件下的表达模式
Fig. 5 The expression profiling of *PmSAMS* under drought stress and re-watering

75%、36%和 24% 分别为土壤相对含水量, 2、6 和 12 h 为复水后的时间。

75%, 36%, and 24% were soil relative moisture content; 2, 6, and 12 h were the time after re-watering.

相对含水量为 75% 时) 时有一定量的表达; 在干旱胁迫下(土壤相对含水量为 36% 时) 表达量升高, 干旱胁迫非常严重时(土壤相对含水量 24%) 表达受到抑制, 表达量降低到比正常生长的表达量还低的水平; 在严重干旱复水后 2 h, 该基因的表达量再一次升高, 随后降低至正常水平。糜子 *PmSAMS* 基因的表达高峰出现在干旱胁迫与严重干旱后复水的初期, 说明该基因主要参与糜子对干旱胁迫及复水处理的响应过程。

3 讨论

S-腺苷甲硫氨酸(SAM)是乙烯及多胺生物合成的甲基供体, 在体内主要起转甲基、转硫和转氨基的作用, 在医疗上主要用来治疗肝病、抑郁症、关节炎等多种疾病^[13]。近年来的研究表明, 乙烯和多胺都参与了植物多种胁迫的抗逆反应, 因而认为

SAM可能在植物的抗逆反应中发挥了一定的作用^[3,5]。杨建昌等^[14]研究发现, 在水分胁迫下叶片中多胺含量的变化与品种的抗旱性有密切联系, 植物体内的多胺含量越高, 对水分胁迫的抗性就越强。陈坤明等^[15]在对小麦在研究小麦多胺与抗旱性的关系中发现, 在植株复水后, 两个春小麦品种中的 3 种多胺(腐胺, 亚精胺, 精胺)含量均迅速升高, 说明多胺对水分状况变化的敏感性, 并暗示多胺可能在植株的伤害恢复中具有重要作用。

目前许多植物的 *SAMS* 基因已经被克隆, 分析表明 *SAMS* 是一个小的多基因家族, 其中一些基因组成性表达, 另一些基因的表达则受发育阶段或环境因素的严格控制^[6,16-20]。长春花、拟南芥、番茄、水稻等植物 *SAMS* 基因研究表明该基因一般没有内含子, 5' 不翻译区域有差别的 8~13 bp 对基因的转录和翻译有重要作用。拟南芥中有 4 个 *SAMS* 基因 (<http://www.arabidopsis.org>), 其中 2 个 (*SAM1* 和 *SAM2*) 的蛋白编码序列相似性达 97%, 在根和茎中表达量很高^[17]。 *SAMS* 基因受多种胁迫诱导表达, 番茄至少有 3 个 *SAM* 基因, 其中 *SAM1* 和 *SAM3* 特异地受盐、甘露醇和 ABA 的诱导表达^[6]; 长春花有 4 个 *SAM* 基因, 且所有 *SAMS* 基因在盐胁迫的幼苗中都诱导表达^[18]; 水稻中 *SAMS* 基因在受水分胁迫时诱导表达^[16]。余涛等^[8]在烟草中克隆的一个 *SAMS* 的新基因, 在正常烟草植株中表达量极低, 但受乙烯利强烈诱导, 同时也受氧化胁迫、盐胁迫及高温胁迫的诱导。Gupta 等^[11]的研究表明白杨树 S-腺苷甲硫氨酸合成酶基因受高浓度 CO₂ 和 O₃ 诱导表达。Ma 等^[9]发现盐地碱蓬的 *SAMS* 基因受 NaCl 胁迫的正调控, 酶活性检测表明 NaCl 胁迫条件下该酶的活性增强, 同时该基因的表达也受 ABA 及干旱胁迫的诱导。Oono 等^[21]利用微阵列技术分析发现, 在拟南芥中 *SAMS* 基因的表达受复水的诱导。

在我们构建的复水文库中, 共出现了 3 个与 *SAMS* 基因同源性较高的 EST 序列(GenBank 收录号分别为 DW177274、DW177307 和 DW177331), 出现频率较高。依据其中的一个 EST 序列, 克隆到一个糜子 *SAMS* 基因的 cDNA 全长(*PmSAMS*), 半定量 RT-PCR 分析表明该基因受干旱胁迫和复水的诱导。这些结果与上述相关研究的结果一致, 因而推测该基因可能是糜子抗旱与水分高效利用的关键功能基因, 可以利用它转化小麦、玉米等植物, 提高其抗旱性和水分利用效率。目前正在构建该基因的过量和

RNAi 沉默表达载体, 转化小麦等作物, 探讨其作为新的抗旱节水基因用于作物抗旱节水性改良的可行性。

4 结论

克隆到一个糜子 *SAMS* 基因的全长 cDNA 序列 (*PmSAMS*), 长 1 293 bp, 编码 396 个氨基酸, 具有 *SAMS* 的典型 N 端结构域、中间结构域及 C 端结构域。多种植物 *SAMS* 的氨基酸相似程度非常高(在 92%~97% 之间), 糜子与水稻的相似性最高, 说明 *SAMS* 在植物进化中非常保守。*PmSAMS* 在糜子幼苗干旱胁迫时诱导表达, 干旱胁迫严重时表达受到严重抑制, 严重干旱复水 2 h 后表达再一次增强, 复水 6 h 后其表达量再一次降低。表明 *PmSAMS* 基因可能是糜子抗旱节水紧密相关的基因。

References

- [1] Lin F Y, Hu Y G, Song G Q, Zhang H, Liu T M, He B R. Isolation and analysis of genes induced by rehydration after serious drought in broomcorn millet (*Panicum miliaceum* L.) by using SSH. *Chin J Agric Biotechnol*, 2006, 3: 237–242
- [2] Lin F-Y(林凡云), Hu Y-G(胡银岗), Song G-Q(宋国琦), He B-R(何蓓如). Gene expression profile analysis of broomcorn millet during rehydration after serious drought by means of SSH. *J Northwest A & F Univ (Nat Sci Edn)*(西北农林科技大学学报·自然科学版), 2007, 35(3): 81–86 (in Chinese with English abstract)
- [3] Heby O, Persson L. Molecular genetics of polyamine synthesis in eukaryotic cells. *Trends Biochem Sci*, 1990, 15: 153–158
- [4] Tabor C W, Tabor H. Methionine adenosyltransferase (Sadenosylmethionine synthetase) and S-adenosylmethionine decarboxylase. *Adv Enzymol*, 1984, 56: 251–282
- [5] Yang S F, Hoffman N E. Ethylene biosynthesis and its regulation in higher plants. *Ann Rev Plant Physiol Plant Mol Biol*, 1984, 35: 155–189
- [6] Espartero J, Pintor-Toro J A, Pardo J M. Differential accumulation of S-adenosylmethionine synthetase transcripts in response to salt stress. *Plant Mol Biol*, 1994, 25: 217–227
- [7] Izhaki A, Shoseyov O, Weiss D. A petunia cDNA encoding S-adenosylmethionine synthase. *Plant Physiol*, 1995, 108: 841–842
- [8] Yu T(余涛), Zhi L-F(支立峰), Peng L(彭论), Li Y-S(李阳生), Zhu Y-G(朱英国). Cloning and characterization of a novel S-adenosyl-L-methionine synthase gene in tobacco. *Wuhan Bot Res* (武汉植物学研究), 2004, 22 (4): 277–283 (in Chinese with English abstract)
- [9] Ma X L, Wang Z L, Qi Y C, Zhao Y X, Zhang H. Isolation of S-adenosylmethionine synthetase gene from *Suaeda salsa* and its differential expression under NaCl stress. *Acta Bot Sin*, 2003, 45: 1359–1365
- [10] Zhang J-G(张建国), Li X-H(李新华), Yuan Z-Y(袁中一). Research advances in gene and structure of S-adenosyl-L-methionine synthetase. *Industr Microbiol* (工业微生物), 2005, 35(3): 39–44 (in Chinese with English abstract)
- [11] Gupta P, Duplessis S, White H, Karnosky D F, Martin F, Podila G K. Gene expression patterns of trembling aspen trees following long-term exposure to interacting elevated CO₂ and tropospheric O₃. *New Phytol*, 2005, 167: 129–142
- [12] Vanden B N, Crampton B G, Hein I, Birch P R, Berger D K. High-throughput screening of suppression subtractive hybridization cDNA libraries using DNA microarray analysis. *BioTechniques*, 2004, 37: 818–824
- [13] Luo Y-X(罗赞星), Zhao F-K(赵辅昆), Luo G-M(罗贵民), Yuan Z-Y(袁中一). Research and development of S-Adenosyl-L-methionine. *Industr Microbiol* (工业微生物), 2006, 36(1): 54–59 (in Chinese with English abstract)
- [14] Yang J-C(杨建昌), Zhang Y-J(张亚洁), Zhang J-H(张建华), Wang Z-Q(王志琴), Zhu Q-S(朱庆森). Changes in contents of polyamines in the flag leaf and their relationship with drought-resistance of rice cultivars under water deficit stress. *Acta Agron Sin* (作物学报), 2004, 30(11): 1069–1075 (in Chinese with English abstract)
- [15] Chen K-M(陈坤明), Zhang C-L(张承烈). Polyamine contents in the spring wheat leaves and their relations to drought-resistance. *Acta Phytophysiol Sin* (植物生理学报), 2000, 26(5): 381–386 (in Chinese with English abstract)
- [16] Breusegem Van F, Dekeyser R, Gielen J, Montagu Van M, Caplan A. Characterization of a S-adenosylmethionine synthetase gene in rice. *Plant Physiol*, 1994, 105: 1463–1464
- [17] Peleman J, Boerjan W, Engker G, Seurinck J, Botterman J, Alliotte T, Montagu Van M, Inzé D. Strong cellular preference in the expression of a housekeeping gene of *Arabidopsis thaliana* encoding S-adenosylmethionine synthetase. *Plant Cell*, 1989, 1: 81–93
- [18] Schröder G, Eichel J, Breining S, Schröder J. Three differentially expressed S-adenosylmethionine synthetases from *Catharanthus roseus*: Molecular and functional characterization. *Plant Mol Biol*, 1997, 33: 211–222
- [19] Shen B, Li C, Tarczynski M C. High free-methionine and decreased lignin content result from a mutation in the Arabidopsis S-adenosyl-L-methionine synthetase 3 gene. *Plant J*, 2002, 29: 371–380
- [20] Gómez-Gómez L, Carrasco P. Differential expression of the S-Adenosyl-L-Methionine synthase genes during pea development. *Plant Physiol*, 1998, 117: 397–405
- [21] Oono Y, Seki M, Nanjo T, Narusaka M, Fujita M, Satoh R, Satou M, Sakurai T, Ishida J, Akiyama K, Iida K, Maruyama K, Satoh S, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K. Monitoring expression profiles of *Arabidopsis* gene expression during rehydration process after dehydration using ca.7000 full-length cDNA microarray. *Plant J*, 2003, 34: 868–887