DOI: 10.3724/SP.J.1006.2010.00017

水稻(*Oryza sativa* L.) α -淀粉酶基因的进化及组织表达模式

廖登群^{1,2} 张洪亮¹ 李自超^{1,*} John BENNETT^{2,3}

¹ 中国农业大学 / 农业部作物基因组学与遗传改良重点实验室 / 北京市作物遗传改良重点实验室, 北京 100193; ² Plant Breeding, Genetics and Biotechnology Division, International Rice Research Institute, DAPO Box 7777, Metro Manila, Philippines; ³ School of Biological Sciences, University of Sydney, NSW 2006, Australia

摘要: α -淀粉酶在植物特别是谷类萌发种子淀粉降解中具有重要作用。水稻 α -淀粉酶基因的结构、进化和表达研究已有报道, 但多集中于 *OsAmy1* 和 *OsAmy3* 这两个亚族内基因间以及发芽种子中。不同亚族间的基因结构、进化及更多组织和时期的表达特点尚缺乏细致研究。本研究通过 TblastN 同源性比对及保守结构域分析揭示水稻基因组含有 11 个 α -淀粉酶基因。生物信息学分析、系统进化树构建及半定量 RT-PCR 分析表明, 该家族基因在结构上发生了明显的分化, 具有清晰的进化层次, *OsAmy5A* 和 *OsAmy4A* 是家族中较原始状态的基因; 在表达和功能上也发生了明显分化, 进化水平较高的基因发生了明显的时空表达特异性分化。*OsAmy1A*、*OsAmy3A* 及 *OsAmy3D* 和 *OsAmy3E* 分别在保证种子植物世代传递、维持种子休眠过程中胚的微弱生命活动及保证种子萌发过程中能量的稳定持续供应上具有重要作用。

关键词: 水稻; α -淀粉酶; 基因结构; 进化; 表达

Characterization of Evolution and Tissue-Expression of Rice (*Oryza sativa* L.) α -Amylase Genes

LIAO Deng-Qun^{1,2}, ZHANG Hong-Liang¹, LI Zi-Chao^{1,*}, and John BENNETT^{2,3}

¹ China Agricultural University / Key Laboratory of Crop Genomics & Genetic Improvement of Ministry of Agriculture / Beijing Key Laboratory of Crop Genetic Improvement, Beijing 100193, China; ² Plant Breeding, Genetics and Biotechnology Division, International Rice Research Institute, DAPO Box 7777, Metro Manila, Philippines; ³ School of Biological Sciences, University of Sydney, NSW 2006, Australia

Abstract: α -amylases play an important role in starch degradation in plants, especially in cereal germinating seeds. Existing reports on structural organization and evolution of rice α -amylase family mainly focus on members of subfamilies *OsAmy1* and *OsAmy3* and their expression in germinating seeds, however, it is not known whether the putative α -amylase genes else exist in rice genome and what their structural organization, evolution and expression profiling look like especially among subfamilies. Via TblastN search and conservative domain analysis, we revealed that there were 11 putative α -amylase genes in rice genome. Through tools of bioinformatics, phylogenetic reconstruction and semi-quantitative RT-PCR, we studied the structural evolution among these 11 α -amylase genes and their spatial-temporal expression profiling. The results showed that there was a distinctly divergent and ranked gene structure among members of this family. *OsAmy5A* and *OsAmy4A* were the most primitive genes, and other ones were evolved from them mainly through loss of introns and fixed more conserved domains and sequences. These genes were also divergent in expression and function. The more primitive the genes are the less spatial-temporal specificity in gene expression they have. *OsAmy5A*, *OsAmy4A*, and *OsAmy2A* were expressed in all tissues, however, the rest were expressed spatially and temporally. *OsAmy1A*, which was expressed at the beginning of seed germination but not all during the grain filling stage, should serve to control energy supply between generations. *OsAmy3A*, both expressed dramatically at the end of grain filling and the initiation of seed germination, should be related to sustaining life activities in embryos of dormancy seeds. *OsAmy3D* and *OsAmy3E* were regulated at the gene expression level by sugar concentration during seed germination, and may play an important role in stable and continuous energy supply during seed germination.

Keywords: Rice; α -Amylase; Gene structure; Evolution; Expression profiling

本研究由 2003 Theme 1 Budget of the Challenge Program for Water and Food 和国家高技术研究发展计划(863 计划)项目(2006AA10Z158)资助。

* 通讯作者(Corresponding author): 李自超, E-mail: lizichao@cau.edu.cn

Received(收稿日期): 2009-07-14; Accepted(接受日期): 2009-09-07.

淀粉是地球生物能量供应的重要来源,是许多植物特别是禾本科植物的一种主要能量和碳骨架的存在形式,广泛分布于植物的根、茎、叶和种子中^[1]。储藏在这些器官中的淀粉需要通过降解才能最终被植物本身或异养生物利用来维持各项生命活动。淀粉的降解是一个复杂的过程,需要一系列酶的催化与调控,包括 α -淀粉酶、葡聚糖水解酶、 β -淀粉酶、 α -葡萄糖苷酶等^[2]。作为一种限制性内切酶, α -淀粉酶(EC 3.2.1.1)在这一过程中具有重要作用,水解直链淀粉和支链淀粉的 α (1 $\rightarrow$ 4)糖苷键产生线性麦芽单糖和分枝葡萄糖苷,从而便于其他酶类参与该过程最终将淀粉降解为生物可利用的单糖^[3]。研究表明,该酶的活性与很多重要农艺性状(如发芽率、幼苗活力、产量、耐冷性、耐低氧胁迫等)显著正相关^[4-7]。尽管 α -淀粉酶在淀粉降解及其参与的生命活动中具有重要作用,但对其研究却多数仅限于谷物类的萌发种子(尤其大麦^[8-11]和水稻^[12-17])、水稻愈伤^[18],而对于其在其他器官中的表达研究较少^[1,19-20]。

α -淀粉酶在绝大多数物种中含有多个基因成员,而且存在多种同功酶。比如,经基因克隆或注释发现,该家族成员在拟南芥有3个^[21]、苹果有11个^[21]、大麦有11个^[22]、小麦至少有22个^[22]。Huang等^[12-13]通过Southern杂交技术证明水稻基因组含有10个 α -淀粉酶基因。又据杂交结果及与小麦、大麦等 α -淀粉酶基因DNA序列的同源性结果将这10个基因分为5组聚为3类,分别命名为*RAmy1*、*RAmy2*和*RAmy3*,每组基因据此被命名为*RAmy1A-1C*、*RAmy2A*、*RAmy3A-3F*。Ranjhan等^[14]通过三倍体和限制性酶切分析及低温(65℃)Southern杂交条件同样发现了这10个基因,并将其定位在5个染色体上。其中,只有3个基因的全长cDNA(表1)和7个基因的全长基因组(*RAmy1A*、*RAmy2A*、*RAmy3A-3E*)在当时被克隆测序,而*RAmy1B*只有5'端537 bp的序列被克隆。直到1992年,*RAmy1C*的5'端和3'端cDNA序列被分离^[15],全长序列却直到2007年才由Yoon等人克隆(NCBI核酸及蛋白数据库登录号分别为EU267975.1及ACA50497.1)。除*RAmy3F*以外,其他基因的全长cDNA序列随着基因组测序和全基因组的FL-cDNA/EST的克隆测序的大规模开展而相继被获得(表1),而*RAmy3F*到现在仍然无法确定。水稻基因组测序及组装完毕使我们得以快速鉴定水稻基因组中所有 α -淀粉酶基因,而大规模的全长cDNA和EST的克隆及测序,使我们能准确预测和分析基因的外显子和内含子的分布情况。

随着水稻 α -淀粉酶基因陆续被分离出来,其结构特征、进化、表达和功能分析逐渐被报道。Sutliff等^[23]研究了*RAmy3A*、*RAmy3B*和*RAmy3C*等3个基因的内含子特征,并分析了其在发芽种子不同时期以及胚愈伤中的表达,发现发芽后4 d的种子中*RAmy3B*和*RAmy3C*大量表达,而*RAmy3A*不表达。Abe等^[24]通过分别构建*RAmy1A*和*RAmy3E*的细菌表达系统鉴定了水稻*RAmy3E*基因适应低温的区段(Phe179-Trp205: α -helix-4, β -sheet-5, α -helix-5)。Karrer等^[25]比较了8个水稻和2个大麦 α -淀粉酶基因在发芽种子胚和糊粉层的表达情况,发现水稻基因在两个组织中都具有表达特异性,其中,*RAmy3A*和*RAmy2A*在两个组织中均不表达;而大麦高等电点和低等电点的基因具有不同的时序表达模式。Hwang等^[7]通过比较9个水稻基因指出,*Amy3*亚族的基因在缺氧条件下受糖饥饿或能量缺乏所诱导,其表达可能是水稻幼苗能够在缺氧胁迫下成活和生长的一个重要因素。Umemura等^[26]和Yu等^[15]也发现该亚族的*RAmy3D*基因的表达受糖类似物抑制。通过研究幼苗活力与*RAmy1A*基因表达的关系^[27]、缺氧对*RAmy1A*在发芽种子及幼苗中表达的影响^[7,28]及*RAmy1A*表达与赤霉素的关系^[29-31],认为以*RAmy1A*为代表的水稻*Amy1*和*Amy2*亚族的基因表达受赤霉素诱导并受糖含量的调控。迄今,对*RAmy1A*和*Amy3*亚族的研究较多,而对*RAmy1B*、*RAmy1C*和*RAmy3A*研究较少;且基因表达研究多集中于萌发种子、苗期的叶片和愈伤,而对开花后产量形成期发育种子(授粉后10 d的穗子)及根系的研究仅见Huang等^[13]的报道。

本文通过生物信息方法在水稻中发现了两个具有 α -淀粉酶基因特征的新基因;分析了它们与已报道的9个基因(*RAmy1A-1C*、*RAmy2A*、*RAmy3A-3E*)的结构和进化关系,及其在水稻不同组织与时序的表达,尤其是开花授粉后种子发育过程中的表达特征,为进一步研究水稻 α -淀粉酶基因的功能与进化和调控奠定了基础。

1 材料与方法

1.1 水稻 α -淀粉酶家族基因的鉴定及注释

用大麦 α -淀粉酶基因*HvAmy1*全长蛋白序列(P00693)作为查询序列,经TblastN 粳稻日本晴基因组数据库(NCBI)和籼稻93-11基因组数据库(<http://rice.genomics.org.cn/rice/index2.jsp>)以获得可能的 α -淀粉酶家族基因。评判hit是否为目标候选基因的标

表 1 水稻 α -淀粉酶 TblastN 结果及分子特征
Table 1 TblastN results on α -amylase genes in the rice genome and their molecular properties

基因 Gene	克隆编号 Ref No. ^a	染色体及位置 Chr (cM) ^b	全长 cDNA 编号 FL-cDNA No. ^c	克隆年代 Year for cloning ^d	内含子数 Introns	氨基酸数 No. of AA	等电点/分子量 pI/MW	查询得分/E 值 Query score/ E-value ^e
<i>OsAmy1A</i>	AP005287	2(138/147.9)	M24286	1989	3	434	5.06/48456.54	447
	AAAA02007456							6E-117
<i>OsAmy1B</i>	AP003312	1(71.7/181.8)	AK063489*	2001	3	414	11.79/45334.19	202
	AAAA02001616							7E-82
<i>OsAmy1C</i>	AP005287	2(138/147.9)	EU267975	2007	3	428	5.07/47713.65	447
	AAAA02007456							6E-117
<i>OsAmy2A</i>	AP004678	6(120.1/124.4)	X64619	1992	3	445	5.25/48696.03	496
	AAAA02020902							6E-139
<i>OsAmy3A</i>	AP005891	9(63/93.5)	AK099330	2002	3	438	6.83/48714.38	584
	AAAA02027656							1E-165
<i>OsAmy3B</i>	AP005891	9(63/93.5)	M24941	1989	2	438	5.75/48591.54	584
	AAAA02027656							1E-165
<i>OsAmy3C</i>	AP005891	9(63/93.5)	AK101358	2002	2	437	5.83/48637.50	584
	AAAA02027656							1E-165
<i>OsAmy3D</i>	AP004399	8(90.5/121.2)	M24287	1989	2	435	5.95/47911.21	500
	AAAA02025750							1E-165
<i>OsAmy3E</i>	AP004399	8(90.5/121.2)	AK064300	2001	2	437	5.32/48707.65	500
	AAAA02025750							1E-165
<i>OsAmy4A</i>	AP003408	1(123.2/181.8)	AK065152	2001	12	876	5.72/98044.15	82.8
	AAAA02003743							1E-14
<i>OsAmy5A</i>	AL607005	4(56.1/129.6)	Os04g33040*	EST	11	416	5.63/47339.00	99.8
	AAAA02013705							1E-19

^a 上表格表示籼稻 BAC/PAC 克隆编号, 下表格表示籼稻重叠群编号; ^b 括号内/前后的数字分别表示基因所在 BAC/PAC 号在染色体的位置和染色体全长; ^c NCBI 数据库的编号; ^d 全长 cDNA 被克隆出的年代; ^e 上表格表示查询得分, 下表格表示查询 E 值。
^a For a gene, the upper code indicates japonica BAC/PAC Acc. and the lower indicates the indica contig No.; ^b The number before and after “/” means the position of BAC/PAC and the total length of the chromosome; ^c No. in the NCBI database; ^d Year for cloning FL-cDNA; ^e For a gene, the upper number indicates the query score (bits), and the lower indicates the query E-value.

准为 Score>50、E 值<10⁻⁴。对这些候选基因的蛋白序列比对和 Interproscan 分析发现, 在水稻基因组中有 11 个基因含有 α -淀粉酶的功能结构域特征, 即催化结构域 (PF00128) 和 Alpha-amyl_C2 结构域 (PF07821), 在 NCBI 数据库均被注释为和 α -淀粉酶相关。这 11 个基因中, 除前述已报道的 9 个基因外, 有两个基因的功能和研究尚未报道。因此, 我们认定这两个基因属于 α -淀粉酶家族的新成员。本文根据目前对水稻基因的通用命名规则对这 11 个基因进行了系统命名, 对已知的 9 个基因继续采用原名称, 但用“*Os*”代替“*R*”。由于新认定的两个 α -淀粉酶基因在用蛋白质聚类分析结果中都不归属于已知的 3 组, 因此将其命名为 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A*。由 <http://www.expasy.org/tools/> 中的 Compute pI/MW 软件预测了其分子特性。水稻 α -淀粉酶基因的命名、染色体

位置及分子特性等信息见表 1。

1.2 α -淀粉酶家族基因进化分析

构建进化树时以蛋白质保守结构域序列为研究数据, 先用 ClustalX(1.83) 比对 (<http://www-igbmc.u-strasbg.fr/BioInfo/ClustalX/>), 再用 Mega4.0 构建。在 Mega4.0 中分别选邻近距离法和 Jones-Taylor-Thornton (JTT) 模型, Bootstrap 分析重复数为 1 000。
为分析水稻 α -淀粉酶基因的进化关系及历程, 选取了莱茵衣藻等低等植物基因在内的共 70 个 α -淀粉酶基因来构建进化树。通过 TblastN 或 BlastP 搜索基因组数据库 TIGR、<http://genome.jgi-psf.org/> 和 NCBI 及 TIGR 的转录子数据库获得其他植物基因的序列。如果目标基因的基因组序列或转录子拼接体还未翻译成蛋白序列, 则分别用在线基因预测软件 (<http://www.softberry.com/berry.phtml>) 和

expasy.org/tools/dna.html)来获得全长蛋白序列,同时用 InterProScan 软件(<http://www.ebi.ac.uk/InterProScan/>)和已知的 EST/FlcDNA 确认新注释的正确与否。所用物种及其基因名称(及 Acc. No.),在低等植物中为单细胞绿藻莱茵衣藻(*Chlamydomonas reinhardtii*)的 *CreAmyA1-2* (XM_001694150, XM_001695962); *Ostreococcus lucimarinus* 的 *OlAmy1-4* (XM_001416331, XM_001418649, XM_001420025, XM_001421519); 最简单的多细胞团藻(*Volvox carteri*)的 *VcAmy1-2* (C_230010, C_420085); 非维管束植物球莼藓(*Physcomitrella patens*)的 *PpaAmy1-4* (XM_001777531, XM_001782778, XM_001752929, XM_001785768); 江南卷柏(*Selaginella moellendorffii*)的 *SelmolAmy1-4* (3332149:3, C_scaffold_2000046, gw1.96.86.1, 3329694: 2); 在裸子植物中为火炬松(*Pinus taeda*)的 *PtaAmy1-2* (TA11018, TA6895); 云杉(*Picea sitchensis*)的 *PsiAmy1-2* (EF085126, EF084978); 恩氏云杉×加拿大杉(*Picea engelmannii* × *Picea glauca*)的 *PegAmy* (TA149_373101); 在双子叶植物中为拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)的 *AtAMY1-3* (AY084871, AY117294, At1g69830); 葡萄(*Vitis vinifera*)的 *VvAmy1-5* (XM_002270013, XM_002285177, XM_002282148, XM_002276836, XM_002284769); 杨树(*Populus trichocarpa*)的 *PthAmy1-5* (3.00400291, 3.0033012902, 3.0003010601, 3.00170485, C_LG_X0868); 苹果(*Malus × domestica*)的 *MdAmy1-4* (TA46797_3750, AY939872, AY939869, AF153828); 在单子叶植物中为水稻(表 1), 玉米(*Zea mays*)的 *ZmAmy1-6* (BT067363, BT043419, BT041453, EU940907, BT042214, BT067340); 高粱(*Sorghum bicolor*)的 *SbAmy1-8* (gw1.2.15565.1, Sb02g026620, Sb02g023790, Sb03g032830, Sb04g034150, Sb04g034140, Sb06g015110, Sb07g023010); 小麦(*Triticum aestivum*)的 *TaAmy 1,3-4* (TA79244_4565, X05809, AK335373); 大麦(*Hordeum vulgare*)的 *HvAmy1-2* (M17128, M17125); 燕麦(*Avena fatua*)的 *AfaAmy2A* 和 *AfaAmy 2D* (AJ010728, AJ010729)。

1.3 总 RNA 的提取及半定量 RT-PCR

1.3.1 实验材料的培养 用于研究基因时空表达特性的组织包括胚愈伤组织、萌发的种子和根、苗期叶片、开花前后的花药、子房等。所用品种为热带籼稻 IR64, 由菲律宾国际水稻研究所种子库提供。除愈伤组织和萌发种子及根外, 提供其余组织的 IR64 都在温室进行培养。在秧盘中萌发种子, 幼苗生长 21 d 后移栽到装有 3 kg 土壤的盆中, 每千克

土壤分别底施 N、P 和 K 0.2 g、0.1 g 和 0.2 g; 每天浇水 2 次, 以维持土壤表面被水浸没; 在孕穗期追肥一次, 用量为底肥的 1/4。

1.3.2 实验组织的取样方法 在 N6 再生培养基上培养 1 周后收获愈伤组织, 培养基含 2.7 g L^{-1} 脯氨酸、 300 mg L^{-1} 酪蛋白氨基酸、 30 g L^{-1} 蔗糖、 4 g L^{-1} 凝固剂(Gelrite)和 2 mg L^{-1} 2,4-D (所有药品来自 Sigma Chemical Company, St. Louis MO, USA)。种子经 50% (V/V)的次氯酸钠溶液消毒 5 min 后用灭菌的去离子水漂洗干净, 再均匀排列在用灭菌水湿润的过滤纸上, 在 30°C 下暗培养 48 h 后取样。把种子和根分开并分别迅速放入液氮中冷冻保存以防 RNA 降解。研究 *OsAmy* 在萌发种子中表达 time-course 的种子培养与取样同此方法。移栽 3 周后, 在日落时取主分蘖上已伸展完毕的倒第二叶。开花前 17 h、4 h 和邻近开花前(分别简称为 17hBA、4hBA 和 BA)取花药, 小穗的开花时间以温室种植下的水稻开花高峰上午 9:30 为起始点。为了减少取样误差, 分别在当天/前一天已开花的小穗附近取开花前 17 h 和 4 h 的小穗及开花前的小穗。取样时选取花丝伸长、花药达到颖壳顶部但还未散粉、颖壳饱满的小穗。花药及后面颖壳和子房的取样策略是, 先取整小穗迅速放入液氮中冷冻保存以防 RNA 降解, 最后在实验室冰上分离所需组织用于 RNA 提取。颖壳样来自采集花药时的小穗颖壳。子房的取样中, 为避免由于标记小穗而人工诱导小穗开花, 在正式取样前先对开花过程中花丝伸长、花丝弯曲度、花药散粉、内外稃张合角度等进行观察, 记录这些器官在颖壳打开后 0、5、10、15、30、60 min 的相对空间位置和发育特征, 以此判断开花后 30 min 的小穗。在开花结束后的下午用记号笔标记当天开花的小穗, 分别在开花后的 1、3、5、10、15 和 30 d 的当天上午 9:00 取子房样。

1.3.3 总 RNA 的提取 对淀粉含量较高的组织(包括萌发种子、颖壳、授粉 3 d 以后的子房), 采用 SDS-RNA 提取液(STSEM)和 Trizol 提取液(由 Invitrogen 生产)相结合的方法提取总 RNA (<http://www.ag.arizona.edu/research/larkinslab/protocols>)。其他组织的 RNA 用 Trizol 提取液提取。

1.3.4 RT-PCR 第一链 cDNA 的合成 总 RNA 经 DNase I (Promega Corporation, Madison, WI, USA)纯化、琼脂糖电泳检测质量和定量后, 根据 Invitrogen 公司 Superscript II reverse transcriptase 的方法用 0.5

μg oligo(dT)₁₆ 引物把 5 μg 总 RNA 反转录成第一链 cDNA。反转录所需的主要试剂 Superscript II reverse transcriptase 和 RNAase inhibitor 分别购于 Invitrogen 和 Progema。

1.3.5 RT-PCR 引物设计 遵循一般的引物设计原则, 反向引物主要设计在 3'端的 UTR 中; 除 *OsAmy5A* 外, 前导引物都跨了 1 个内含子, 设计在倒数第 2 个外显子上。各基因相应引物的序列、在基因组及 mRNA 水平上的扩增大小等信息见表 2。

1.3.6 PCR 及电泳 RT-PCR 的反应总体积为 20 μL , 包括: 2 μL (稀释 10 倍后)第一链反转录产物, 0.5 μL 10 mmol L⁻¹ dNTPs 混合物, 10 μmol L⁻¹ 引物, 1.0 U *Taq*-Plus DNA 聚合酶(天根), 3 mmol L⁻¹ MgCl₂。PCR 程序为预变性(94℃ 3 min), 35 个反应循环(变性 94℃ 30 s, 退火 57℃ 1 min, 延伸 72℃ 1 min), 循环完成后 72℃ 延伸 5 min, 最后 10℃ 保存。内参基因为水稻 *OsGAPDH*。取 10 μL PCR 产物在 1.2% 琼脂糖上电泳分离, EtBr 染色, 用 ImageMaster VDS (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ, USA)凝胶成像系统扫描照相。

2 结果与分析

2.1 两个 α -淀粉酶新基因的确定

TblastN 结果表明水稻基因组共有 11 个具有 α -淀粉酶保守结构域特征的基因(表 1), 除 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 外, 其余 9 个基因已由美国加州大学戴维斯分校的 Rodriguez 课题组确定^[12-14]。*OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 是随水稻基因组测序完成而发现具有 α -

淀粉酶催化结构域(PF00128)和(Alpha-amyl_C2)结构域(PF07821)特征的两个新基因, 分别位于 1 号和 4 号染色体上, 这样水稻 α -淀粉酶基因共分布于 6 条染色体上(表 1)。位于同一染色体的同源基因表现紧密连锁, 基因间隔 5 kb 左右。除位于 9 号染色体的 *OsAmy3A*、*OsAmy3B* 和 *OsAmy3C* 外, 其他位于同一染色体的基因呈反式串联排列。

新确定的 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 除等电点外, 在很多方面与已克隆的 9 个 α -淀粉酶基因不一样。*OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 分别含有 12 个和 11 个内含子, 氨基酸数分别为 876 和 416, pI 为 5.72 和 5.63, MW 为 98 044.15 Da 和 47 339.0 Da。Interproscan 分析表明 *OsAmy4A* N 端的 484 个氨基酸残基为未知功能的肽段, 485~874 区段含有 α -淀粉酶基因的结构域。

2.2 水稻 α -淀粉酶基因的同源性与基因结构

对 *OsAmy* 基因编码框的核苷酸和蛋白质全长序列分别进行的同源性分析(表 3)显示, 水稻 α -淀粉酶许多基因表现出高度同源, 而新发现的 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 与其他水稻 α -淀粉酶基因的同源性较低, 在 cDNA 和蛋白质水平上分别只有 50%和 45%的同源性。其中, 如 Huang 等^[7]杂交结果所示, *OsAmy1A* 和 *OsAmy1C*、*OsAmy3B* 和 *OsAmy3C* 在两个水平上都高度同源, 序列一致性都在 95%左右。本研究结果显示 *OsAmy1B* 与 *OsAmy1A*、*OsAmy1C* 的核苷酸序列一致性在 88%左右, 表现出很高的同源性; 与其他基因同源性也较高, 序列一致性 65%以上; 但在蛋白质一级结构水平上与其他基因的同源性最低,

表 2 用于分析水稻 α -淀粉酶基因表达特性的引物
Table 2 Primer list of rice α -amylase genes used for expression profiling analysis

基因 Gene	正向引物 Forward primer (5'-3')	反向引物 Reverse primer (5'-3')	扩增片段大小 Amplicon size ^a (bp)
<i>OsAmy1A</i>	GCTACGCATACATCCTCACC	GCTAAACTGAGAGTCTCGTCATC	322/406
<i>OsAmy1B</i>	GCTGGTCAACTGGGTCAATC	GTATCATGCCACGGGTGTATATC	474/562
<i>OsAmy1C</i>	GACCTTCATCGACAACCATG	TCGCGTACATAGTTCAGATCAG	489/581
<i>OsAmy2A</i>	GCTGTCACCTTCGTCGACAAC	CGATCCACATATCAGTGACG	532/1079
<i>OsAmy3A</i>	CAAGGTCATTCTGGGCTACG	AGCTTGCGAGCCGTTTCTAG	356/446
<i>OsAmy3B</i>	CATCGACAACCATGACACTG	CAGGCAGGTAGAATACATAG	540/640
<i>OsAmy3C</i>	CATCGACAACCATGACACTG	GTCCTGAAAGAAATATTTGGC	412/502
<i>OsAmy3D</i>	GTCACGTTTCGTCGACAACCAC	GAGCATGACTATCCCGTTTCAG	437/525
<i>OsAmy3E</i>	CTTCCGACAAGGTCATGCAGG	CTGCAGGATTAACAGGGTAC	538/623
<i>OsAmy4A</i>	GCATTTACAGCCAGAGATTGC	CAGGATAACCGGTGATTCTGC	472/573
<i>OsAmy5A</i>	CGAGATCAGTCACATTTGTTG	GTACTAGCATATACAGTTTCG	457/957

^a “/”前后分别指 cDNA /DNA 扩增片段大小。

^a Number before and after “/” means length of amplicons in cDNA / genomic size.

表 3 水稻 α -淀粉酶基因的同源性
Table 3 Homology of rice α -amylase genes

基因 Gene ^a	<i>OsAmy1A</i>	<i>OsAmy1B</i>	<i>OsAmy1C</i>	<i>OsAmy2A</i>	<i>OsAmy3A</i>	<i>OsAmy3B</i>	<i>OsAmy3C</i>	<i>OsAmy3D</i>	<i>OsAmy3E</i>	<i>OsAmy4A</i>	<i>OsAmy5A</i>
<i>OsAmy1A</i>	—	24.8	94.6	73.4	65.1	69.5	68.1	69.1	68.2	43.9	45.4
<i>OsAmy1B</i>	87.9	—	24.8	21.5	22.3	21.9	21.4	22.5	20.7	16.9	17.7
<i>OsAmy1C</i>	95.3	88.0	—	73.4	65.2	69.2	68.0	68.6	67.7	44.6	45.1
<i>OsAmy2A</i>	76.4	70.7	77.0	—	63.9	66.6	66.1	67.8	64.7	45.6	44.7
<i>OsAmy3A</i>	74.1	68.8	74.5	72.6	—	76.7	75.3	75.7	73.4	44.7	41.5
<i>OsAmy3B</i>	73.0	67.5	73.4	70.2	78.8	—	95.4	76.3	78.5	44.5	41.7
<i>OsAmy3C</i>	72.1	66.5	72.5	70.1	77.9	94.2	—	75.4	79.1	44.0	41.2
<i>OsAmy3D</i>	74.4	69.2	75.9	74.3	79.6	79.1	78.7	—	73.3	43.4	42.4
<i>OsAmy3E</i>	76.4	70.5	76.7	72.4	78.8	79.9	79.4	81.3	—	46.0	44.5
<i>OsAmy4A</i>	49.9	47.3	50.1	51.6	49.9	51.6	51.3	47.9	50.2	—	49.9
<i>OsAmy5A</i>	49.7	47.5	49.8	51.5	48.9	48.3	48.7	50.5	50.6	55.8	—

^a 对角线上方为蛋白质, 对角线下方为 cDNA, 序列一致性(%)用 DNAMAN 程序计算获得。
^a the identities of protein sequences were listed above the diagonal, those of the corresponding cDNA sequences were listed below the diagonal. The identity (%) was determined using DNAMAN program.

即使是保守序列区间的氨基酸序列(370 aa)与其他基因的同源性也只有 20%~40%, 而其他基因间保守序列区间的氨基酸序列同源性在 43%~98% (数据未列出)。Huang 等^[12-13]并未分析到 *OsAmy1B* 与其他 *OsAmy* 在氨基酸组成上的低同源性。

对 *OsAmy1B* 和 *OsAmy1A*、*OsAmy1C* 编码框区间的基因组和 mRNA 序列进行比对发现, 这 3 个基因具有相同的基因结构, 剪切位点的核苷酸序列完全一致, 但 *OsAmy1B* 在编码框内发生了 3 处插入突变和 9 次缺失突变, 其中有 3 处的核苷酸缺失高达 17 bp 以上(17、20 和 29 bp)(图略), 使得阅读框发生了移位, 从而蛋白质的氨基酸组成发生了很大的变化, α -淀粉酶的保守结构域被隔断, α -amyl-C2 缺失。

图 1 所示为水稻 11 个 α 淀粉酶基因的外显子、内含子、拼接点和某些保守结构域的情况。*OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 的内含子远远多于其他 9 个基因, 分别有 12 个和 11 个, 其次为 *Amy1* 亚家族的 3 个基因以及 *OsAmy2A* 和 *OsAmy3A*, 有 3 个内含子, *Amy3* 亚家族的其他 4 个基因全都具有 2 个内含子。对所有基因拼接点两侧氨基酸和核酸序列的比对表明, 有 7 个拼接点在两个以上的基因中具有保守的序列和位置, 但没有 1 个拼接点在所有基因中都保持有效。除上述 7 个以外的拼接点中, *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 中分别有 10 个和 5 个拼接点在其他基因中是无效的。*OsAmy4A* 中有 4 个无效拼接点, 而 *OsAmy5A* 中仅拼接点 7 表现为无效。由于如前所述的移码现象, *OsAmy1B* 在 7 个拼接点两侧翼 3 个氨基酸的序列发

生了变化, 但是仍可以在除拼接点 3 和 4 外的 5 个拼接点找到高度保守的氨基酸序列和对应位置。其中, *OsAmy1B* 在拼接点 1 两侧翼 3 个氨基酸残基由 LFQ/GFN 变为 PVS/GFQ, 拼接点 2 由 GEQ/GYM 变为 ASK/ATC, 拼接点 7 由 PCI/FYD 变为 THA/SST, 拼接点 5 的氨基酸是保守的(STQ/HLW), 而拼接点 6 仅保留了对应位置。7 个拼接点中, 拼接点 1、6、7 在不同基因的有效性上非常保守, 而拼接点 2 具有有效和无效拼接点的基因比例几乎相同。*OsAmy5A* 上的两个有效拼接点 3 和 4 则分别只在 *OsAmy4A*、*OsAmy2A* 和 *OsAmy3A*、*OsAmy3E* 保留着无效的拼接点保守序列。该拼接点的结果与 Huang 等^[12]分析 *OsAmy3A*、*OsAmy3B* 和 *OsAmy3C* 的结果一致。除上述拼接点外, 我们检查了 3 个 α -淀粉酶基因的保守结构域 β 3、 β 7 和 loop3^[32], 其序列特征分别为 TF*DNHDT、D*V*NHR 和 LY*L(*)₄₋₅G, 分别位于水稻 α -淀粉酶基因拼接点 2 下游 108 bp 处、拼接点 5 上游 15 bp 处和拼接点 2 下游 18 bp 处。11 个水稻 α -淀粉酶基因在 3 个重要保守结构域表现出了严格的保守性。但是, 这 3 个保守结构域(尤其 loop3)在不同物种间表现出一定的变异性, 发生变异的基因包括 3 个苹果基因(*MdAmy2*、*MdAmy4* 和 *MdAmy3*)和 3 个低等的藻类植物基因(*OlAmy3*、*OlAmy2* 和 *OlAmy1*)。另外, 我们通过比较 18 个物种 70 个植物 α -淀粉酶家族基因发现了一个保守序列。该序列的特征为 G(*)₆GG(*)₄LDWGP, 该序列位置附近某些低等植物上的序列特征为 G(*)₆G(*)₄W。水稻

图 1 水稻 α -淀粉酶基因家族的外显子、内含子、拼接点和某些保守结构域

Fig. 1 Exons, introns, splice points, and conserved sites of some domains in rice α -amylase family

每个基因上面所标数字为拼接点或无效拼接点前面片段的最后一个碱基在该基因中的位置。

The number above the gene shows the position of the last base of the fragment before splice point or noneffective splice point in the gene.

OsAmy5A 缺失该序列, *OsAmy4A* 则包含与低等植物一样的序列。上述内含子分布、拼接点的保守性以及保守结构域的保守性, 表现出明显的进化关系, 即由低等到高等内含子趋向丢失、结构域保守性增强(具体见讨论部分)。

2.3 植物 α -淀粉酶基因的进化分析

对水稻 α -淀粉酶基因进行的结构分析表明这些基因间发生了明显的分化。为进一步研究各基因的进化关系, 我们收集了 18 种植物共 70 个 α -淀粉酶基因, 利用这些基因的保守结构域氨基酸序列构建了植物 α -淀粉酶基因的系统进化树(图 2)。由图 2 可以看出, 植物 α -淀粉酶基因表现出明显的顺序分化关系。类群 I 由 25 个基因组成, 全部为处于进化链最高级的单子叶植物基因, 包括水稻除 *OsAmy5A* 和 *OsAmy4A* 外的 9 个基因, 并将 9 个水稻基因的 3 个亚族 *Amy1*、*Amy2* 和 *Amy3* 分别归类到 3 个亚群中。接下去的 5 个类群沿进化树顺序依次排列, 类群 II 包括 6 个基因, 全部为双子叶植物基因; 类群 III 包括裸子植物的 5 个基因; 类群 IV 由 7 个基因组成, 包括了在进化时间上处于裸子植物和低等植物之间

的卷柏(*Selaginella moellendorffii*)的 3 个基因和几个来自其他低等植物的基因; 类群 V 和 VI 分别包括 13 个和 14 个基因, 既有来自低等植物的基因又有来自高等植物的基因, 并分别包含水稻的 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A*, 以及 1 个和 3 个单细胞植物的基因, 类群 VI 还包括一个被认为比拟南芥基因 *AtAmy1* 和 *AtAmy3* 原始一些的 *AtAmy2*^[21]。很多研究认为生物在进化过程中, 内含子的数量和某些保守结构和序列会发生有规律的变化^[33-34]。因此, 我们检测了所有 70 个基因的内含子以及保守结构域($\beta 3$ 、 $\beta 7$ 和 loop3)和保守序列 $G(*)_6GG(*)_4LDWGP$ 的情况, 结果表明类群 I 和 II 中的基因内含子数量较少, 均为 2~3 个; 而类群 V 和 VI 中的基因内含子数量较多, 多数为 10 个左右, 但 *OlAmy* 的基因除外, 均未发现有内含子存在; 类群 IV 中的基因内含子 6~10 个(同样, *OlAmy* 的基因无内含子); 因裸子植物所在类群(III)的基因缺乏基因组数据, 无法确定其内含子数量。保守结构域和保守序列的分析结果表明, 完全由来自高等植物基因组成的 3 个类群(I、II、III)在 3 个结构域和序列上完全保守; 类群 IV 的 7 个基因中, 卷柏

图 2 植物 α -淀粉酶基因的系统进化树

Fig. 2 Phylogenetic tree of viridiplantae α -amylase genes

标了点的基因中不具有保守序列 $G(*)_6GG(*)_4LDWGP$, 标了三角号的基因中同时不具有上述保守序列和结构域 loop3, *OsAmy1B* 所在枝被裁切为原有长度的 1/8。

The dotted genes are changed in the conserved sequence $G(*)_6GG(*)_4LDWGP$; the genes with triangle are changed in the above conserved sequence and loop3; branch length for *OsAmy1B* was shortened to 1/8 of the original length.

的 3 个基因完全保守, 而两个来自单细胞植物的基因不具有保守序列 $G(*)_6GG(*)_4LDWGP$; 类群 V 和 VI 的基因, 除 *VvAmy1*、*CreAmy2* 和 *PpaAmy3* 外, 其他不管是来自高等植物还是来自低等植物的基因均不含保守序列 $G(*)_6GG(*)_4LDWGP$, *MdAmy3*、*OlAmy2*、*MdAmy4* 和 *MdAmy2* 等 4 个基因的 loop3 结构域也是非保守的。从以上结果可以看出, 类群 V 和 VI 中的基因可能是比较原始的类型, 并依次向类群 IV、III、II、I 进化, 在该过程中发生了内含子丢失和保守结构域及序列固定的事件。因而, *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 可能是水稻基因组中最古老的 α -淀粉酶基因, 其他 9 个基因是新近进化来的。

综合上述水稻 11 个基因的同源性、基因结构和进化树分析, 水稻基因可能存在以下进化关系: *OsAmy5A* 最原始, 在进化成 *OsAmy4A* 时丢失了 4 个拼接点, 在丢失了 5 个拼接点并产生 1 个新的有效拼接点后分别进化成 *OsAmy2A* 和 *OsAmy3A*, 并由 *OsAmy2A* 进化成 *OsAmy1A* 和 *OsAmy1C*, 并由 *OsAmy1C* 或 *OsAmy1A* 通过移码进化为 *OsAmy1B*; 通过 *OsAmy3A* 进化成 *OsAmy3B-3E*。

2.4 水稻 α -淀粉酶的时空表达特异性

α -淀粉酶作为淀粉代谢的重要酶体系之一, 其表达活性对淀粉代谢尤其是降解具有重要影响。图 3 表明, 所有 α -淀粉酶基因都在愈伤组织、萌发(尤

图 3 水稻 α -淀粉酶基因在水稻不同组织及吸胀后不同时间种子中的表达
Fig. 3 Expression of rice α -amylase genes in different organs and seeds with different time after imbibition

其 24 h 后)的种子中大量表达。*OsAmy2A*、*OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 在所有的组织中都表达, 但只有 *OsAmy5A* 为较稳定的组成型表达, 即在不同萌发时间的种子(从吸胀到吸水后 72 h)、愈伤组织、萌发种子、根、幼苗嫩叶、开花时不同时间点的花药、颖壳和受粉后不同时期的子房中的转录水平几乎一样, 而其他基因在表达强度上则表现出一定的组织和时间特异性。 α -淀粉酶家族唯一具有叶绿体信号肽的 *OsAmy4A* 在愈伤组织、嫩叶、颖壳和子房中表达量一样, 呈较强的组成型表达。*OsAmy4A* 在生长旺盛或需要较多能量供应的组织中表达较强, 比如快要开花的成熟花药中表达量明显上调, 在授粉后子房发育前期以及吸水 12 h 后的种子中有较强表达; 但在其他生命活动较弱的组织中则表达较弱, 如在萌发种子早期、根和 15 DAA、30 DAA 子房中表达量明显较少。*OsAmy2A* 虽在所有组织都表达, 但主要在开花后 0.5 h、1 DAA、10 DAA 的子房中表达量较高。除上述 3 个基因外, 其他 α -淀粉酶基因的表达具有非常强的组织特异性。*OsAmy1A*、*OsAmy3B* 和 *OsAmy3C* 具有类似的表达特点, 在愈伤组织、萌发的种子和根中大量表达; 但在萌发的种子中三者开始表达的时间不同, *OsAmy1A* 从萌发开始便有较弱表达并逐渐增强, 而 *OsAmy3B* 和 *OsAmy3C* 则在种子吸水 24 h 后才大量表达。核苷酸序列与 *OsAmy1A*、*OsAmy1C* 高度同源的 *OsAmy1B* 只在愈

伤组织、萌发的种子中大量表达, 在萌发种子中开始表达的时间与 *OsAmy3B* 和 *OsAmy3C* 类似。*OsAmy1C* 除了与 *OsAmy1A* 同样在愈伤组织、萌发的种子和根中大量表达外, 还在花药中表达, 但表达相对较弱。*OsAmy3A* 和 *OsAmy3E* 在种子发育后期被诱导大量表达, 而 *OsAmy3D* 只有微弱表达; 在萌发种子中, *OsAmy3A* 一开始便有高水平的表达, 并有减弱趋势, 这解释了为什么 Sutliff 等^[23]在发芽后 4 d 的种子中没有检测到该基因的表达, 这可能与其取样时间较晚有关。

3 讨论

3.1 α -淀粉酶基因家族的结构进化

多基因家族这一现象普遍存在于真核生物中, 其进化规律和动力的研究对于我们理解生物的进化, 以及实现对基因的调控与改造具有重要意义。 α -淀粉酶基因家族在微生物、动物和植物中广泛存在^[35], 可见是一个非常古老的多基因家族。近年来, 对该家族基因的结构特征及进化分析一直没有间断过, 但是, 主要集中于对第一(*Amy1*)和第三(*Amy3*)亚族内基因的分析^[12-13], 而对包括新确立的 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 在内的各亚族 α -淀粉酶基因间的结构特点和进化关系知之甚少。

本研究对来自 18 种植物共 70 个 α -淀粉酶基因的系统分化分析结果表明, 该基因家族形成 6 个类群,

从类群 I 到类群 VI 呈现出明显由高等到低等的分化关系,即从完全的单子叶植物,到双子叶植物、裸子植物、低等维管束植物。类群 V 和 VI 虽然从来源上看包括了从单细胞植物到高等的单子叶植物,但是,这两个类群内有些基因不具有保守功能域 loop3 的结构,绝大多数基因不具有完全由高等植物组成的类群中基因的保守序列;而且,被认为较原始的 *AtAmy2*^[21] 也在类群 VI 中。可见,这两个类群的基因是比较原始状态的基因。对不同类群的内含子数检测表明,在这两类原始基因中,除单细胞藻类基因 (*OlAmy*) 不具有内含子,大多数基因都具有比高等植物基因较多的内含子。原始类型的水稻 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 就分别含有 12 个和 10 个内含子,明显多于其他 9 个水稻 α -淀粉酶基因。这一结果与 Huang 等^[12] 对水稻 α -淀粉酶基因 *OsAmy3* 亚族的研究结果一致,也支持 Doolittle 等^[36] 认为进化过程以内含子丢失为主的观点。

保守结构域和保守序列是多基因家族的重要特征之一,也是家族内各成员行使类似功能的主要基础。本研究表明,进化水平较高的高等植物基因具有较多的结构域和保守序列,从而,形成比较复杂的表达体系,以满足高等生物对复杂生命活动系统调控的需要。11 个水稻 α -淀粉酶基因中,越是原始的基因,其表达的时空特异性越弱,比如 *OsAmy4A* 和 *OsAmy5A* 在各组织和时期的表达基本没有差异;而进化水平较高的基因(如 *OsAmy1A*、*1C*、*OsAmy3B*、*3C*、*3D* 和 *3E* 等)则表现出明显的组织特异性。由此,我们认为复杂结构域和保守序列的形成和固定是高等生物维持复杂生命活动的基础。

3.2 α -淀粉酶基因家族功能的分化

功能的分化与专化是多基因家族的重要特征之一。本研究中,11 个水稻 α -淀粉酶基因表现出了明显的时空表达上的分化。主要表现为,越是原始类型的基因其表达的特异性越弱,而进化水平较高的基因特异性表达较强。其中,最原始的 *OsAmy5A* 在所研究的不同组织和不同萌发时间的种子间几乎观察不到表达上的差异;*OsAmy4A* 和 *OsAmy3A* 虽在所有检测的组织中都表达,但其表达的强度已经发生了分化;其他分化水平更高的基因,则表现出了明显的时空表达特异性。

OsAmy4A 在生长旺盛或需要较多能量供应的组织中表达较强,比如快要开花的成熟花药表达量明显上调,在授粉后子房发育前期以及萌发种子 12 h

后有较强表达;但在其他生命活动较弱的组织则表达较弱,如在萌发种子早期、根和 15 DAA、30 DAA 子房中表达量明显较少。*OsAmy4A* 的这种组织表达差异性模式说明,该基因对于快速降解淀粉提供组织所需能量具有重要作用。

Sugimoto 等^[31] 研究认为, *OsAmy1A* 受 GA3 诱导表达,萌发时,首先起始于种子内的鳞片组织,然后在靠近胚的糊粉层表达。Hwang 等^[7] 的研究表明 *OsAmy1A* 的表达会受到缺氧胁迫的抑制。本研究中 *OsAmy1A* 在种子形成过程中始终没有表达,但在种子萌发开始便有表达,说明该基因具有在需要储藏淀粉的组织中及逆境条件下受到抑制,从而避免在非适宜条件下淀粉降解造成能量损耗;当种子接收到水分信号等类似适宜萌发的信号后迅速启动淀粉降解,开始下一个世代的生长发育。因此, *OsAmy1A* 在保证种子植物世代传递上具有重要作用,对其研究很可能对控制禾谷类作物穗发芽具有重要意义。

OsAmy3A 在种子发育后期和发芽开始便大量表达,很可能与种子休眠过程中维持胚的微弱生命活动有关。*OsAmy3D* 和 *OsAmy3E* 在发芽种子前 3 d 的中期表达量达到高峰,但后者比前者高峰来得晚且持续时间更长。该现象与前人研究结果一致,认为二者在糖损耗时受到激发,并在糖浓度达到一定水平时受到抑制^[7,15,26]。可见,这两个基因均受到糖浓度的调控,在保证种子萌发过程中能量的稳定持续供应上具有重要作用。不过,我们结果显示, *OsAmy3D* 的表达峰比 *OsAmy3E* 更靠前,但持续时间较短,说明 *OsAmy3D* 在对糖浓度的感应上比 *OsAmy3E* 更敏感,且可能在代谢链上比后者靠前。

4 结论

水稻 α -淀粉酶基因家族由 11 个成员组成,是一个非常古老的家族。该家族在结构上发生了明显的分化,具有清晰的进化层次。从低等到高等,内含子以丢失为主,形成了更多更稳定的结构域和保守序列。该基因家族在表达和功能上也发生了明显分化, *OsAmy5A* 和 *OsAmy4A* 是家族中较原始状态的基因,在表达上时空特异性较弱;而其他进化水平较高的基因则发生了明显的表达时空特异性分化。*OsAmy1A* 在保证种子植物世代传递上可能具有重要作用, *OsAmy3A* 很可能与种子休眠过程中维持胚的微弱生命活动有关, *OsAmy3D* 和 *OsAmy3E* 在保证种子萌发过程中能量的稳定持续供应上具有重要作用。

References

- [1] Stanley D, Farnden K J F, MacRae E A. Plant α -amylases: Functions and roles in carbohydrate metabolism. *Biologia, Bratislava*, 2005, 60(suppl 16): 65–71
- [2] Smith A M, Zeeman S C, Smith S M. Starch degradation. *Annu Rev Plant Biol*, 2005, 56: 73–98
- [3] Beck E, Ziegler P. Biosynthesis and degradation of starch in higher plants. *Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol*, 1989, 40: 95–117
- [4] Williamson J F, Peterson M L. Relation between alpha amylase activity and growth of rice seedlings. *Crop Sci*, 1973, 13: 612–614
- [5] Karrer E E, Chandler J M, Foolad M R, Rodriguez R L. Correlation between α -amylase gene expression and seedling vigor in rice. *Euphytica*, 1993, 66: 163–169
- [6] Guglielminetti L, Yamaguchi J, Perata P, Alpi A. Amylolytic activities in cereal seeds under aerobic and anaerobic conditions. *Plant Physiol*, 1995, 109: 1069–1076
- [7] Hwang Y S, Thomas B R, Rodriguez R L. Differential expression of rice α -amylase genes during seedling development under anoxia. *Plant Mol Biol*, 1999, 40: 911–920
- [8] Rogers J C. Two barley alpha-amylase gene families are regulated differently in aleurone cells. *J Biol Chem*, 1985, 260: 3731–3738
- [9] Khurshed B, Rogers J C. Barley alpha-amylase genes. Quantitative comparison of steady-state mRNA levels from individual members of the two different families expressed in aleurone cells. *J Biol Chem*, 1988, 263: 18953–18960
- [10] Gubler F, Jacobsen J V. Gibberellin-responsive elements in the promoter of a barley high-pl [alpha]-amylase gene. *Plant Cell*, 1992, 4: 1435–1441
- [11] Sogaard M, Kadziola A, Haser R, Svensson B. Site-directed mutagenesis of histidine 93, aspartic acid 180, glutamic acid 205, histidine 290, and aspartic acid 291 at the active site and tryptophan 279 at the raw starch binding site in barley alpha-amylase 1. *J Biol Chem*, 1993, 268: 22480–22484
- [12] Huang N, Sutliff T D, Litts J C, Rodriguez R L. Classification and characterization of the rice alpha-amylase multigene family. *Plant Mol Biol*, 1990, 14: 655–668
- [13] Huang N, Koizumi N, Reinl S, Rodriguez R L. Structural organization and differential expression of rice alpha-amylase genes. *Nucl Acids Res*, 1990, 18: 7007–7014
- [14] Ranjhan S, Litts J C, Foolad M R, Rodriguez R L. Chromosomal localization and genomic organization of alpha-amylase genes in rice (*Oryza sativa* L.). *Theor Appl Genet*, 1991, 82: 481–488
- [15] Yu S M, Kuo Y H, Sheu G, Sheu Y J, Liu L F. Metabolic derepression of alpha-amylase gene expression in suspension-cultured cells of rice. *J Biol Chem*, 1991, 266: 21131–21137
- [16] Itoh K, Yamaguchi J, Huang N, Rodriguez R L, Akazawa T, Shimamoto K. Developmental and hormonal regulation of rice [alpha]-amylase (*RAmy1A*)-*gusA* fusion genes in transgenic rice seeds. *Plant Physiol*, 1995, 107: 25–31
- [17] Mitsui T, Yamaguchi J, Akazawa T. Physicochemical and serological characterization of rice [alpha]-amylase isoforms and identification of their corresponding genes. *Plant Physiol*, 1996, 110: 1395–1404
- [18] Chen M H, Liu L F, Chen Y R, Wu H K, Yu S M. Expression of amylases, carbohydrate metabolism, and autophagy in cultured rice cells is coordinately regulated by sugar nutrient. *Plant J*, 1994, 6: 625–636
- [19] Tetlow I J, Morell M K, Emes M J. Recent developments in understanding the regulation of starch metabolism in higher plants. *J Exp Bot*, 2004, 55: 2131–2145
- [20] Zeeman S C, Smith S M, Smith A M. The breakdown of starch in leaves. *New Phytol*, 2004, 163: 247–261
- [21] Stanley D, Fitzgerald A M, Farnden K J F, MacRae E A. Characterization of putative α -amylases from apple (*Malus domestica*) and *Arabidopsis thaliana*. *Biologia, Bratislava*, 2002, 57(suppl 11): 137–148
- [22] Huang N, Stebbins G L, Rodriguez R L. Classification and evolution of α -amylase genes in plants. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1992, 89: 7526–7530
- [23] Sutliff T D, Huang N, Litts J C, Rodriguez R L. Characterization of an α -amylase multigene cluster in rice. *Plant Mol Biol*, 1991, 16: 579–591
- [24] Abe R, Chiba Y, Nakajima T. Characterization of the functional module responsible for the low temperature optimum of a rice α -amylase (*Amy3E*). *Biologia, Bratislava*, 2002, 57(suppl 11): 197–202
- [25] Karrer E E, Litts J C, Rodriguez R L. Differential expression of α -amylase genes in germinating rice and barley seeds. *Plant Mol Biol*, 1991, 16: 797–805
- [26] Umemura T A, Perata P, Futsuhara Y, Yamaguchi J. Sugar sensing and α -amylase gene repression in rice embryos. *Planta*, 1998, 204: 420–428
- [27] Karrer E E, Chandler J M, Foolad M R, Rodriguez R L. Correlation between α -amylase gene expression and seedling vigor in rice. *Euphytica*, 1993, 66: 163–169
- [28] Huang J R, Toyofuku K, Yamaguchi J, Akita S. Expression of α -amylase isoforms and the *RAmy1A* gene in rice (*Oryza sativa* L.) during seed germination, and its relationship with coleoptile length in submerged soil. *Plant Prod Sci*, 2000, 3: 32–37
- [29] Washio K, Ishikawa K. Structure and expression during the germination of rice seeds of the gene for a carboxypeptidase. *Plant Mol Biol*, 1992, 19: 631–640
- [30] Morita A, Umemura T A, Kuroyanagib M, Futsuhara Y, Perata P, Yamaguchi J. Functional dissection of a sugar-repressed α -amylase gene (*RAmy1A*) promoter in rice embryos. *FEBS Lett*, 1998, 423: 81–85
- [31] Sugimoto N, Takeda G, Nagato Y, Yamaguchi J. Temporal and spatial expression of the α -amylase gene during seed germination in rice and barley. *Plant Cell Physiol*, 1998, 39: 323–333
- [32] Janecek S. Alpha-amylase family: Molecular biology and evolution. *Prog Biophys Mol Biol*, 1997, 67: 67–97
- [33] Sánchez D, Ganfornina M D, Gutiérrez G, Marín A. Exon-intron structure and evolution of the lipocalin gene family. *Mol Biol Evol*, 2003, 20: 775–783
- [34] Li W, Liu B, Yu L, Feng D, Wang H, Wang J. Phylogenetic analysis, structural evolution and functional divergence of the 12-oxo-phytodienoate acid reductase gene family in plants. *BMC Evol Biol*, 2009, 9: 90
- [35] Janecek S. Sequence similarities and evolutionary relationships of microbial, plant and animal α -amylases. *Eur J Biochem*, 1994, 224: 519–524
- [36] Doolittle W F. The origin and function of intervening sequences in DNA: A review. *Am Nat*, 1987, 130: 915–928