DOI: 10.3724/SP.J.1006.2012.01187

马铃薯块茎颗粒结合型淀粉合酶基因的克隆及其 RNAi 载体的构建

刘玉汇^{1,2} 王 丽³ 杨宏羽¹ 余 斌^{1,2} 李元铭⁴ 张俊莲^{1,2,*}
王 蒂^{1,2,*}

¹ 甘肃省作物遗传改良与种质创新重点实验室 / 甘肃农业大学农学院, 甘肃兰州 730070; ² 甘肃省干旱生境作物学重点实验室, 甘肃兰州 730070; ³ 甘肃农业大学生命科学技术学院, 甘肃兰州 730070; ⁴ 甘肃农村发展研究院, 甘肃兰州 730070

摘 要: GBSSI 是马铃薯块茎中控制直链淀粉合成的关键酶, 为培育高支链淀粉含量或纯支链淀粉含量的转基因马铃薯材料, 根据 GenBank 登录号 X58453 的序列设计特异引物, 采用 RT-PCR 技术获得马铃薯块茎 GBSSI 相似基因, 并利用生物信息学相关软件分析, 预测 GBSSI 相似基因 cDNA 序列编码的蛋白质结构和功能。结果表明, 克隆的 GBSSI 相似基因与报道的 GBSSI 基因序列相似性达到 99.78%, 其开放阅读框长 1 824 bp, 编码 607 个氨基酸, 具有许多重要功能位点。三级结构预测结果表明, 该蛋白具有淀粉合成功能, 基因序列已注册到 GenBank, 序列登录号为 EU403426。以此基因 CDS 内 542 bp 的靶标序列作为干扰区段, 扩增 GBSSI 的正反向基因片段, 并引入 237 bp 的内含子序列, 构建由 Patatin 启动子驱动的具有“正义基因片段 *gbssA*-内含子 *VP1-ABI3-like protein*-反义基因片段 *gbssB*”的植物干扰表达载体 pBI121g-PgABI。本研究结果将为淀粉合成的进一步研究和高支链淀粉含量或纯支链淀粉含量的马铃薯品种的培育奠定基础。

关键词: 马铃薯; 颗粒结合型淀粉合酶; 基因克隆; 序列分析; RNAi 载体

Cloning of Granule-Bound Starch Synthase Gene and Construction of Its RNAi Vector in Potato Tuber

LIU Yu-Hui^{1,2}, WANG Li³, YANG Hong-Yu¹, YU Bin^{1,2}, LI Yuan-Ming⁴, ZHANG Jun-Lian^{1,2,*}, and WANG Di^{1,2,*}

¹ Gansu Key Laboratory of Crop Genetic & Germplasm Enhancement / College of Agronomy, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China;

² Gansu Key Laboratory of Aridland Crop Science, Lanzhou 730070, China; ³ College of Life Sciences and Technology, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China; ⁴ Gansu Rural Development Research Institute, Lanzhou 730070, China

Abstract: There is about 17% starch in potato (*Solanum tuberosum* L.) tubers. Potato starch granules are composed of two polysaccharides, unbranched amylose (approximately 20% to 25%) and branched amylopectin (approximately 75% to 80%). To develop transgenic potato with high-amylopectin in tubers, we got a cDNA sequence of the potato GBSSI from the total RNA of potato tubers by RT-PCR using specific primers of conserved domain of GenBank Accession Number X58453 sequence. The GBSSI cDNA sequence shared 99.78% similarity with the GBSSI gene in GenBank (accession No. X58453). The full-length of cDNA was 1 824 bp, which contained 607 amino acids, three conserved domains and many important functional sites. The 3D structure of GBSSI was highly similar to that of the glycogen synthase, indicating that GBSSI has a function of starch synthesis. GBSSI similar gene obtained here was granule-bound starch synthase, and its sequence was submitted to GenBank, with the accession number of EU403426. On the basis of a 542 bp RNAi target region from the CDS of GBSSI, the sense and antisense fragments were amplified and separated by a 237 bp intron to construct the RNA interference expression vector pBI121g-PgABI containing “sense *gbssA-VP1-ABI3-like protein* intron-antisense *gbssB*” regulated by Patatin promoter, which will lay a solid foundation for the study on synthesis of starch and breeding of transgenic potato with high amylopectin content or pure amylopectin.

Keywords: Potato; GBSSI gene; Gene cloning; Sequence analysis; RNA interference vector

本研究由国家科技支撑计划项目(2012BAD06B03), 国家现代农业产业技术体系建设项目(CARS-10-P18)和甘肃省重大专项(1102NKDM025)资助。

* 通讯作者(Corresponding authors): 张俊莲, E-mail: zhangjunlian99@yahoo.com.cn; 王蒂, E-mail: wangd@gsau.edu.cn

第一作者联系方式: E-mail: lyhui@yahoo.cn

Received(收稿日期): 2012-01-09; Accepted(接受日期): 2012-04-15; Published online(网络出版日期): 2012-05-11.

URL: <http://www.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20120511.1826.036.html>

马铃薯(*Solanum tuberosum* L.)淀粉作为一种廉价易得的再生性资源,已成为食品和工业等许多领域的重要原料。马铃薯淀粉中,直链淀粉约占20%~25%,支链淀粉约占75%~80%,淀粉含量及直/支链淀粉比例影响马铃薯加工淀粉的产量及其在食品加工、造纸、化工等工业中的用途^[1]。高支链淀粉由于具有较好的稳定性、溶解性、黏滞性和透明性,适于作增稠预制剂、乳化剂、黏着剂等,被广泛用于食品添加剂,也在造纸、纺织、建筑、石油化工等方面广泛应用^[2]。而高直链淀粉水溶性很低,分子间易结合,易发生凝沉,较难糊化而易老化^[3],目前在许多应用领域中,都要求淀粉具有较低的糊化温度和较弱的凝沉性,已把淀粉的糊化性和老化性作为其应用的重要参考指标^[4]。由于马铃薯没有高支链淀粉的天然突变体,而从普通马铃薯淀粉中分离支链淀粉成本较高,限制了马铃薯支链淀粉的开发和利用。因此,培育高支链淀粉含量或者纯支链淀粉含量的马铃薯品种,对于拓展马铃薯淀粉应用领域,促进马铃薯产业的发展及提高经济效益具有重要的意义。

目前已知颗粒结合淀粉合酶(granule-bound starch synthase, GBSS)在淀粉生物合成过程中催化形成 α -1,4-糖苷键,将ADP葡萄糖连接在 α -1,4-葡聚糖的非还原端,延长 α -1,4-葡聚糖链,是直链淀粉形成过程中的关键酶^[5-6]。GBSS具多种同工型,其中GBSSI又称Waxy蛋白,在淀粉贮存组织中对直链淀粉的合成起关键作用^[7]。Kuipers等^[8]通过反义RNA(antisense RNA)技术抑制GBSSI基因表达,获得了高支链淀粉含量的转基因植株,在黏度、不易凝胶和不易老化等方面具有独特优势。但随之发现,反义RNA引起的基因沉默效果不稳定^[9]。新近开发的RNAi技术,尤其是含有内含子发夹型的RNA干扰(intron splicing hairpin RNAi, ihpRNAi)技术,能引起靶基因85%以上甚至100%沉默^[10]。RNA干扰已广泛应用于多种动植物功能基因组研究和代谢途径分析^[11],并且在作物改良中也得到了成功的应用^[12-14],但在改变马铃薯淀粉组成,提高支链淀粉含量方面的应用研究却鲜有报道。

本研究通过克隆GBSSI基因及利用基因和蛋白质数据库资料对该序列及其推导的氨基酸序列进行功能分析,并选取GBSSI一段保守序列作为靶标,构建以Patatin启动子驱动的正向gbss A-内含子-反向gbss B的ihpRNAi植物表达载体,旨在通过RNAi

介导的基因沉默技术抑制GBSSI的表达,降低GBSSI基因的活性,以期选育出高支链淀粉或者纯支链淀粉的适宜加工的新型马铃薯品种,该研究对于改良马铃薯淀粉品质,降低加工能量消耗,拓宽马铃薯淀粉的应用领域,带动整个马铃薯产业的发展具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

马铃薯四倍体栽培种甘农薯2号微型薯由甘肃省作物遗传改良与种质创新重点实验室(以下简称重点实验室)提供。大肠杆菌(*Escherichia coli*)菌株DH5 α 感受态细胞、pGEM-T Easy Vector [抗性标记为氨苄青霉素(Amp)],购自Promega公司。各种限制性内切酶、T4 DNA连接酶、Taq DNA聚合酶购自TaKaRa公司;PureLink Plant RNA Reagent、Superscript III逆转录试剂盒购自美国Invitrogen生命技术有限公司(以下简称Invitrogen公司);DNA凝胶回收试剂盒购自北京天根公司;其他生化试剂为国产分析纯。带Patatin启动子(2 500 bp)的载体pBIC由甘肃农业大学司怀军教授惠赠;植物表达载体pBI121g-35S由pBI121改进而来,与pBI121的差别在于NOS终止子5'端的Sac I后引入了Xho I位点^[15]。

1.2 马铃薯块茎总RNA提取与cDNA合成

利用PureLink Plant RNA Reagent试剂盒提取马铃薯块茎总RNA。参照Sambrook等^[16]的操作方法,防止RNase污染。将提取的总RNA在经焦碳酸二乙酯(DEPC)处理的1%琼脂糖凝胶上电泳,以溴化乙锭(EB)染色后检查RNA的完整性。利用Superscript III逆转录试剂盒,其中以Oligo(dT)20为引物,在M-MLV反转录酶作用下合成cDNA第1链,具体操作过程见试剂盒说明书并在-20℃下保存cDNA第1链。

1.3 马铃薯颗粒结合淀粉合酶基因(GBSSI)引物设计及克隆

根据已报道的颗粒结合淀粉合酶基因(GenBank登录号为X58453)的编码序列,用Oligo6.0设计1对引物P1(表1),由北京赛百盛公司合成。PCR反应体系为25 μ L,由cDNA模板2 μ L、10 $\times$ buffer 2.5 μ L、10 mmol L⁻¹的N-端和C-端引物各1 μ L、Taq DNA聚合酶0.5 μ L、ddH₂O 17 μ L组成。扩增条件为94℃预变性1 min;94℃变性50 s,53℃退火50 s,72℃延伸2 min,35个循环;72℃延伸10 min;扩增

产物经 EB 染色后在 1% 琼脂糖凝胶上电泳检测。

将扩增得到的目的片段用琼脂糖凝胶试剂盒回收纯化, 并与 pGEM-T Easy Vector 载体连接, 转化感受态细胞, 对所获得的白斑通过滞后质粒、PCR 扩增、*Xho* I 和 *Bam*H I 双酶切鉴定, -80°C 下保存。并送阳性克隆 10 个样品(pGBSS)到生工生物工程(上海)有限公司进行 DNA 测序。

1.4 马铃薯块茎 GBSSI 基因的序列分析

用 DNAMAN version 6.0 软件分析所测序列; 用 ClustalW2 网站的软件比对氨基酸序列; 用 MEGA4.0 进行相似序列进化树分析; 采用 NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml>) 保守功能区 (conserve domain) 在线分析马铃薯 GBSSI 的保守序列; 用 PredictProtein Server 网站分析蛋白质二级结构; 将 GBSSI 氨基酸序列提交至 Phyre 网站, 进行 GBSSI 蛋白质三级结构预测及比对分析, 并用 Rasmol2.6 软件查看 GBSSI 三级结构。

1.5 RNAi 目标区段选择、引物设计及亚克隆

1.5.1 正义基因片段 *gbss A* 和反义基因片段 *gbss B* 的 PCR 扩增 根据 GenBank 公布的 GBSSI 序列,

以及 siRNA 设计原则^[17], 通过分子生物学分析软件 Oligo 6.0 设计两对引物 P2 (*gbss A*) 和 P3 (*gbss B*), 以克隆的 pGBSS 质粒为模板, 扩增反应体系为 25 μL , 由 cDNA 模板 2 μL 、10 $\times$ buffer 2.5 μL 、10 mmol L^{-1} dNTP 1 μL 、10 mmol L^{-1} 引物 p1 1 μL 、10 mmol L^{-1} 引物 p2 1 μL 、*Taq* DNA 聚合酶 0.5 μL 、ddH₂O 17 μL 组成。扩增条件为 94°C 1 min; 94°C 50 s, 53°C 50 s, 72°C 2 min; 30 个循环, 72°C 10 min; 4°C 保存。扩增产物经琼脂糖凝胶纯化回收后克隆到 pGEM-T Easy 载体上, 经 PCR、酶切检测, 将正确的阳性克隆分别命名为 pTg A/pTg B。

1.5.2 马铃薯 *VP1-ABI3-like protein* 基因内含子片段(简称 *VP1 intron*)的克隆 根据 GenBank 公布的马铃薯 *VP1-ABI3-like protein* 基因内含子序列, 设计 1 对引物(P4), 扩增反应体系同 1.5.1。扩增条件为 94°C 预变性 1 min; 进行 94°C 50 s, 49.5°C 50 s, 72°C 2 min, 30 个循环; 再在 72°C 下延伸 10 min, 4°C 保存。扩增产物经琼脂糖凝胶纯化回收后克隆到 pGEM-T Easy Vector 载体上, 经 PCR、酶切检测, 正确的阳性克隆被命名为 pTin。

表 1 目的基因 PCR 扩增引物
Table 1 Specific PCR primers for target genes

基因 Gene	引物序列 Primers sequence (5'-3')	退火温度 Annealing temperature ($^{\circ}\text{C}$)	产物长度 Length of product (bp)
P1	F: Cgctcgag(<i>Xho</i> I)ATGGCAAGCATCACAGCTTCACAC R: CGggtacc(<i>Bam</i> H I)GGGAGTGGCTACATTTTCCTTGGC	53.0	1824
P2	F: GCggtacc(<i>Bam</i> H I)GCTTTCTGCATCCATAACATTG R: GCctcgag(<i>Pst</i> I)TTTTTGCCAGTTCCAAGGACT	50.0	542
P3	F: GCctcgag(<i>Xho</i> I)GCTTTCTGCATCCATAACATTG R: GCAagctt(<i>Hind</i> III)TTTTTGCCAGTTCCAAGGACT	50.0	542
P4	F: GCctcgag(<i>Pst</i> I)CAGACAAAAGACAGGTTTCGTT R: GCAagctt(<i>Hind</i> III)TTACAATTACTATAGCGGGTGATT	49.5	237

1.6 中间过渡载体及 RNAi 载体的构建

用 *Hind* III 和 *Bam*H I 双酶切 pBIC, 回收 pBIC 的小片段(Patatin), 与经同样酶切并回收的载体 pBI121g-35S 连接, 转化大肠杆菌 DH5 α , 构成 pBI121g-P 植物表达载体, 将 35S 启动子换为 Patatin 启动子。

用 *Bam*H I 和 *Pst* I 同时双酶切质粒 pTgA, 回收 pTgA 的小片段(*gbss A*), 与经同样酶切并回收的载体 pBluescript SK(+)连接, 转化大肠杆菌 DH5 α , 得到重组质粒 pSKgA; 用 *Pst* I 和 *Hind* III 同时双酶切 pTin 质粒, 回收 pTin 的小片段(*VP1 intron*), 与经同

样酶切并回收的载体 pSKgA 连接, 转化大肠杆菌 DH5 α , 得到含有正向 *gbss* (*gbss A*)及内含子片段的质粒 pSKgAI; 用 *Xho* I 和 *Hind* III 消化质粒 pTgB, 回收 pTgB 的小片段(*gbss B*), 与经同样酶切并回收的载体 pSKgAI 连接, 转化大肠杆菌 DH5 α , 完成 “正向 *gbss* 片段(*gbss A*)+*VP1 intron* +反向 *gbss* 片段(*gbss B*)” 拼接克隆, 命名为 pSKgABI。

用 *Bam*H I+*Xho* I 酶切 pSKgABI, 回收 pSKgABI 的小片段(*gbss A*+*VP1 intron*+ *gbss B*), 与经同样酶切并回收的载体 pBI121g-P 连接, 转化大肠杆菌 DH5 α , 构成具有 Patatin 启动子驱动的表达载体 pBI121g-

PgABI。

2 结果与分析

2.1 总 RNA 的提取及 *GBSSI* 基因的克隆

本研究用 Invitrogen 公司的 PureLink Plant RNA Reagent 提取试剂盒进行块茎总 RNA 的提取, 琼脂糖凝胶电泳结果显示总 RNA 的 5S、18S 和 28S 的带清晰、完整。利用 cDNA 第 1 链合成试剂盒, 在反转录酶 M-MLV 的作用下, 获得了马铃薯块茎的 cDNA 第 1 链。根据已发表的马铃薯 *GBSSI* 基因序列, 利用 P1 特异性引物, 以 cDNA 第 1 链为模板, 在 *Taq* DNA 聚合酶的作用下进行 PCR 扩增, 期望获得约 1 824 bp 大小的 DNA 片段。对扩增产物电泳检查结果表明, 其大小与预期片段基本一致(图 1), 说明可能获得了 *GBSSI* 基因的 cDNA 克隆。将扩增获得的 *GBSSI* 基因片段与 T 载体连接。蓝白斑筛选后, 进行滞后质粒筛选, 然后利用 PCR 及 *Bam*H I 和 *Xho* I 双酶切鉴定(图 2), 结果显示, 切下约 1 824 bp 大小的 DNA 片段, 由此可初步确定目的片段已连接到 pGEM-T Easy Vector 载体上, 将其定义为 pGBSS。

图 1 马铃薯 *GBSSI* 基因的 PCR 扩增
Fig. 1 PCR amplification of *GBSSI* gene
M: marker III 分子量标记; 1~2: PCR 扩增产物。
M: DNA marker III; 1~2: PCR products.

图 2 白斑滞后质粒的 *Bam*H I 和 *Xho* I 酶切鉴定
Fig. 2 Identification of white spots plasmid digested by *Bam*H I and *Xho* I

2.2 *GBSSI* 基因的 cDNA 序列及蛋白序列分析

2.2.1 *GBSSI* 基因的 cDNA 序列分析 将 pGBSS 质粒交上海生工公司测序。测序结果与原序列(登录号为 X58453)比较后发现, 二者同源性达 99.78%, 根据 ProtParam 软件预测表明, 克隆到的 *GBSSI* 相似基因序列其开放阅读框架为 1 824 bp, 编码 607 个氨基酸和 1 个终止密码子(TAA)(图 3)。将该基因登记在 GenBank 中, 登录号为 EU403426。

该蛋白在第 57~59、66~68、121~123、313~315、362~364、435~437、510~512 和 567~569 处具有蛋白激酶 C 功能, 能将靶蛋白的 Ser/Thr 磷酸化, 从而激活细胞质中某些酶的活性, 参与生化反应调控; 还可与核中转录因子相互作用, 参与基因表达调控。在第 364~370 氨基酸处, 该蛋白具有 1 个酪氨酸蛋白激酶磷酸化位点, 可经自身的酪氨酸磷酸化或各种不同靶蛋白的酪氨酸磷酸化实现信号传递, 其转导的信号通常与细胞生长、繁殖、分化、生存有关。此外, 该蛋白分别在第 16~19、271~274、329~332、374~377、480~483、510~513 和 585~588 个氨基酸残基处还具有 7 个酪蛋白激酶 II 磷酸化位点, 在细胞生存、生长、增殖及凋亡过程中具有重要的功能; 第 31~34 和第 213~216 个氨基酸处具有 2 个 N 端糖基化位点, 使蛋白质能够抵抗消化酶的作用、赋予蛋白质传导信号的功能、或某些蛋白只有在糖基化之后才能正确折叠; 2 个酰胺化位点位于第 299~302 和第 435~438 个氨基酸处; 7 个 N 端酰基化位点分别位于第 70~75、105~110、250~255、309~314、348~353、506~511 和 581~586 个氨基酸处。

用 DNAMAN 软件对该序列与 GenBank 中登记的部分物种的 *GBSSI* 基因的 cDNA 序列进行同源性比较, 并对其氨基酸序列与其他物种 *GBSS* 蛋白用 MEGA4.0 构建进化树(图 4), 结果发现, 该序列与已登记的马铃薯 *GBSSI* 基因的同源性高达 99% 以上, 但与其他科植物同源性较低, 其中, 与旋花科甘薯和大戟科木薯的同源性相对较高, 其次为十字花科拟南芥和豆科类作物, 而与禾本科作物的同源性较低。15 个物种的 *GBSS* 蛋白被聚为 7 个类群, 茄科马铃薯与旋花科甘薯和大戟科木薯聚为一类; 豆科的豌豆、大豆和菜豆聚为一类; 豆科的黄芪和豇豆聚为一类; 禾本科单子叶的小麦和大麦聚为一类; 禾本科单子叶的粟和高粱聚为一类; 禾本科单子叶的玉米和水稻聚为一类; 十字花科的拟南芥单独为一类, 基本表现为属内同源性高, 属间相对低的特点。

```

1  ATGGCAAGCATCACAGCTTCACACCACTTTGTGTCAAGAAGCCAACTTCACTAGACACCAATCAACCTTGTACAGATAGGA
1  M A S I T A S H H F V S R S Q [T S L D] T K S T L S Q I G
85  CTCAGGAACCATCTGACTCACAATGGTTTAAGGGCTGTTAACAAGCTTGATGGGCTCCAATCAAGAACTAATACTAAGGTA
29  L R N H T L T H N G L R A V N K L D G L Q S R T N T K V
169  ACACCCAAGATGGCATTGAGAACTGAGACCAAGAGACCTGGATGCTCAGCTACCATTGTTTGTGAAAGGGAATGAACTTGATC
57  T P K M A F R T E T K R P G C S A T I V C G K G M N L I
253  TTTGTGGTACTGAGGTTGGTCTTGGAGCGAACTGGTGGACTAGGTGATGTTCTTGGCGGACTACCACAGCCCTTGCAGCC
85  F V G T E V G P W S E T G G L G D V L G G L P P A L A A
337  CGCGGACATCGGGTAATGACAATGTCCGCCGTTATGACCAATACAAAGATACTGGGATACTAGCGTTGCGGTTGAGGTCAAA
113  R G H R V M T M S P R Y D Q Y K D T W D T S V A V E V K
421  GTTGGAGACAGCATTGAAATTGTTGTTCTTCTCACTGCTATAAACGTGGGTTGATCGTGTGTTTGTGACCAACCAATGTTG
141  V G D S I E I V R F F H C Y K R G V D R V F V D H P M F
505  TTGGAGAAAGTTTGGGTAACCTGGTTCAAAATCTATGGCCCCAAAGCTGGACTAGATTATCTGGACAATGAACTTAGGTTG
169  L E K V W G K T G S K I Y G P K A G L D Y L D N E L R F
589  AGCTTGTGTGTCAAGCAGCCCTAGAGGCACCTAAAGTTTGAATTTGAACAGTAGCAACTACTTCTCAGGACCATATGGAGAG
197  S L L C Q A A L E A P K V L N L N S S N Y F S G P Y G E
673  GATGTTCTCTTCATTGCCAATGATTGGCAGACAGCTCTCATTCTTGTCTACTGAAGTCAATGTACCAGTCCAGAGGAATCTAT
225  D V L F I A N D W H T A L I P C Y L K S M Y Q S R G I I Y
757  TTGAATGCCAAGGTGCGTTTCTGCATCCATAACATTGCCTACCAAGGCCGATTTTCTTCTCTGACTTCCCTCTTCTCAATCTT
253  L N A K V A F C I H N I A Y Q G R F {S F S D} F P L L N L
841  CCTGATGAATTCAGGGGTTCTTTGATTTTCATTGATGGTTATGAGAAGCCTGTTAAGGGTAGGAAAATCAACTGGATGAAGGCT
281  P D E F R G S F D F I D G Y E K P V K G R K I N W M K A
925  GGGATATTAGAATCAGATAGGGTGGTTACAGTGAGCCCATACTATGCCCAAGAACTTGTCTCTGCTGTTGACAAGGGTGTGAA
309  G I L E S H R V V T V S P Y Y A Q E L V {S A V D} K G V E
1009  TTGGCAGTGTCTTGCAGAACTTGCATACTGGGATTGTGAATGGCATGGATACACAAGAGTGGAAACCCAGCGACTGACAAA
337  L D S V L R K T C I T G I V N G M D T Q E W N P A T D K
1093  TACACAGATGTCAAATACGATATAACCACTGTCTGAGCGCAAAACCTTTACTAAAGGAGGCTCTTCAAGCAGCAGTTGGCTTG
365  Y T D V K Y D I T {T V M D} A K P L L K E A L Q A A V G L
1177  CCTGTTGACAAGAAGGTCCCTTTGATTGGCTTCATCGGCAGACTTGAGGAGCAGAAAGGTTTCAGATATTCTTGTGTGCAATT
393  P V D K K V P L I G F I G R L E E Q K G S D I L V A A I
1261  CACAAGTTCATCGGATTGGATGTTCAAATTGTAGTCTTGGAACTGGCAAAAAGGAGTTTGAGCAGGAGATTGAACAGCTCGAA
421  H K F I G L D V Q I V V L G T G K K E F E Q E I E Q L E
1345  GTGTTGTACCCCTAACAAAGCTAAAGGAGTGGCAAAATTCATGTCCCTTTGGCTCAGATGATCACTGCTGGTGTGATTTTATG
449  V L Y P N K A K G V A K F N V P L A H M I T A G A D F M
1429  TTGGTTCGAAGTAGATTTGAACCTTGTGGTCTCATTGAGTTACATGCTATGCGATATGGAACAGTGCCAATCTGTGCATCGACT
477  L V P {S R F E} P C G L I Q L H A M R Y G T V P I O A S T
1513  GGTGGACTTGTGACACTGTGAAAGAAGGCTATACTGGATTCCATATGGGAGCCTTCAATGTTGAATGCGATGTTGTTGACCCA
505  G G L V D I T V K E G Y T G F H M G A F N V E C D V V D P
1597  GCTGATGTGCTTAAGATAGTAACAACAGTTGCTAGAGCTCTTGCACTGATGGCACCCCTTGCCTTTGCTGAGATGATAAAAAAT
533  A D V L K I V T T V A R A L A V Y G T L A F A E M I K N
1681  TGCATGTGAGGAGCTCTCTGGAAGGCACCTGCCAAGAAATGGGAGACATTGCTATTGGGCTTAGGAGCTTCTGGCAGTGAA
561  C M S E E L S W K A P A K K W E T L L L G L G A {S G} S E
1765  CCCGGTGTGAAAGGGAAGAAATCGCTCCACTTGCCAAGGAAATGTAGCCACTCCCTAA
589  P G V E G E E I A P L A K E N V A T P *

```

图 3 马铃薯 *GBSSI* 基因的 cDNA 序列及其推测的氨基酸序列Fig. 3 Nucleotide sequence and deduced amino acid sequence of *GBSSI*cDNA of *S. tuberosum*

□: 蛋白保守区; ____: 蛋白激酶 C 磷酸化酶位点; 【】: 酪氨酸蛋白激酶磷酸化位点; {} : 酪蛋白激酶 II 磷酸化位点; ____: N 端糖基化位点; □: 酰胺化位点; ■: N 端酰基化位点。

□: protein conserved region; ____: protein kinase C phosphorylation site; 【】: tyrosine kinase phosphorylation site; {} : casein kinase II phosphorylation site; ____: N-glycosylation site; □: amidation site; ■: N-myristoylation site.

图 4 马铃薯 GBSS 与已知 GBSS 类基因氨基酸同源性比对树状图

Fig. 4 Phylogenetic tree based on the amino acid homologues of GBSS and some GBSS genes alignment documented

进化树分支上的数字代表 Bootstrap 值(重复抽样次数为 1000), 直线标尺代表 5% 序列差异。

Numbers on branch nodes are bootstrap values (1000 resamplings). Bar represents 5% sequence divergence.

2.2.2 GBSSI 蛋白质序列特征分析 运用 NCBI 的 Conserved Domains 工具分析克隆基因保守结构域, 发现了 3 个完全保守区, 即 Glycos_transf_1 (糖基转移酶 glycosyl transferase)、glgA (糖原/淀粉合酶 glycogen/starch synthases, ADP-glucose type) 和 Glyco_transf_5 (淀粉合酶催化区 starch synthase catalytic region), 分别在 97~101 (GGLGD)、480~490 (SRFPCGLXQL) 和 503~510 (STGGLVDT) 氨基酸残基处, 说明这些区域具有十分重要的功能, 如 glgA 为 ADP_葡萄糖结合位点^[18-19]。

2.2.3 蛋白质二级结构和三级结构预测 通过 PredictProtein Server 网站的相关软件分析发现, 组成 GBSSI 蛋白的 607 个氨基酸中, 169 个氨基酸可能形成 α 螺旋结构, 115 个氨基酸可能形成 β 折叠片, 323 个氨基酸可能形成无规则卷曲, 将 GBSSI 氨基酸序列提交至 Phyre, 用 PSI-Blast 方法进行多序列比对建模, 对其进行比对分析后选取 d1rzua (糖原合酶 glycogen synthase 1)—GlgA from *Agrobacterium tumefaciens* (31% i.d., E-value=0, Estimated precision=100%) 作为模板进行 GBSSI 蛋白三级结构预测分析, 将 Phyre 网站返回的 d1rzua 模板和 GBSSI 模型

用 Rasmol 软件查看, 结果发现两者单体结构十分相似(图 5), 表明马铃薯 GBSSI 蛋白与原核生物农杆菌的淀粉合酶可能具有相同的功能。

图 5 d1rzua 单体三级结构(左)与预测的 GBSSI 单体三级结构(右)比较

Fig. 5 Monomer 3D structure of d1rzua (left) and GBSSI (right)

2.3 RNAi 目标区段基因的克隆及 RNAi 载体的构建

2.3.1 马铃薯 GBSSI 基因正反义片段的克隆 以克隆的 GBSSI 基因的质粒 pGBSS 为模板、P2、P3 为引物分别进行 PCR 扩增, 分别获得 542 bp 左右的条带, 长度与目标片段长度一致, 回收纯化后分别与 pGEM-T Easy Vector 连接转化 DH5 α , 进行 BamH

I 和 *Pst* I 和 *Xho* I 和 *Hind* III 酶切鉴定。以马铃薯基因组 DNA 为模板, P4 为引物进行 PCR 扩增, 获得 237 bp 左右的条带, 长度与目标片段长度一致, 回收纯化后分别与 pGEM-T Easy Vector 连接转化 DH5 α , *Pst* I 和 *Hind* III 双酶切鉴定。

gbss A 与克隆载体 pBluescript SK(+) 的重组, 用 *Bam*H I 和 *Pst* I 酶切鉴定, 构建重组质粒 pSKgA; *gbss* A 与 *VPL* intron 的拼接, 用 *Bam*H I 和 *Hind* III 双酶切鉴定以及 *Pst* I 和 *Hind* III 双酶切鉴定, 构成含有“*gbss*A+*VPL* intron”的质粒 pSKgAI; *gbss* A+*VPL* intron+*gbss* B 的拼接, 用 *Bam*H I 和 *Xho* I 双酶切鉴定、*Xho* I 和 *Hind* III 酶切鉴定(图 6 和图 7), 完成“*gbss* A+*VPL* intron+*gbss* B”的 *ihp*RNAi 结构, 命名为 pSKgABI; 用 patatin 启动子替换掉 pBI121g-35S 的 35S 启动子, 经 *Hind* III 和 *Bam*H I 酶切鉴定(图 8), 命名为 pBI121g-P; 用 *Bam*H I+*Xho* I 酶切 pSKgABI 和 pBI121g-P, 回收 pSKgABI 的小片段(*gbss* A+*VPL* intron+*gbss* B)及 pBI121g-P 的大片段,

图 6 用 *Bam*H I 和 *Xho* I 鉴定重组质粒 pSKgABI (*gbss* A+intron+*gbss* B)

Fig. 6 Digestion of the recombinant plasmid pSKgABI by *Bam*H I and *Xho* I

M: DNA marker III; 1, 2, 4: pBluescript SK(+)+ *gbss* A+intron+*gbss* B; 3: false positive plasmid.

图 7 用 *Xho* I 和 *Hind* III 鉴定重组质粒 pSKgABI (*gbss* B)

Fig. 7 Digestion of the recombinant plasmid pSKgABI by *Xho* I and *Hind* III

M: DNA marker I; 1, 2, 4: pBluescript SK(+)+ *gbss* A+intron+*gbss* B; 3: false positive plasmid.

图 8 用 *Hind* III 和 *Bam*H I 鉴定表达载体 pBI121g-P

Fig. 8 Digestion of pBI121g-P by *Hind* III 和 *Bam*H I
M: DNA marker III; 1, 2: pBI121g-P; 3: absence; 4: pBIC.

图 9 用 *Bam*H I 和 *Xho* I 鉴定表达载体 pBI121g-PgABI

Fig. 9 Digestion of pBI121g-PgABI by *Bam*H I and *Xho* I
M: DNA marker III; 1-4: pBI121g-PgABI.

利用 T4 DNA 连接酶进行粘端连接, 连接产物转化大肠杆菌 DH5 α 的感受态细胞。转化细胞在 LB 固体平板上进行 50 mg L⁻¹ 的 Kan 筛选后, 再进行 PCR、酶切鉴定(图 9), 构成具有 Patatin 启动子驱动的表达载体 pBI121g-PgABI, 其结构如图 10 所示。

3 讨论

本试验根据已发表的马铃薯 *GBSSI* 基因序列, 采用 RT-PCR 技术克隆到 *GBSSI* 相似基因, 利用生物信息学方法分析发现, 该基因具备一个完整的开放阅读框架, 大小为 1 824 bp, 编码 607 个氨基酸, 具 3 个保守功能区域, 存在着许多重要功能位点。三级结构预测结果表明该蛋白具有淀粉合成功能, 以上信息可为 RNAi 目标片段的选择提供预测参考。

在 RNAi 技术上, Hammond 等^[20]认为干扰片段在 300~500 bp 之间干扰效果好, 太长或太短干扰效果都不太好, 而且靶基因序列长度与载体的填充片段长度有关, 若载体填充片段较长, 目的基因片段太短就不能形成发夹结构^[21]。Burch-Smith 等^[22]认为所选最适片段长度应为 200~600 bp, 而在干扰片段

图 10 pBI121g-PgABI 表达框架示意图
Fig. 10 Structure map of pBI121g-PgABI expressing framework

区域的选择上要求不干扰其他基因的表达。因此,本研究通过对 GBSSI 蛋白的结构分析,选取 GBSSI 基因保守区的 542 bp 的靶标序列作为干扰区段,扩增 GBSSI 的正反向基因片段,分别与 pGEM-T Easy Vector 重组。之后进行一系列的酶切、连接、转化操作,分别将正反向基因和内含子与酶切位点对应的中间克隆载体 pBluescript SK(+)重组,成功构成载体 pSKgABI。引入内含子的设计是为了使其形成发夹结构,高效表达 dsRNA,之后将 pSKgABI 中的“正义基因片段 *gbssA*-内含子 *VP1-ABI3-like protein*-反义基因片段 *gbssB*”片段插入到 pBI121g 植物表达载体中,成功构建 RNAi 干扰载体 pBI121g-PgABI。

多项研究结果表明,反义 GBSSI 基因或 RNAi 沉默 GBSSI 基因,可显著提高植株的支链淀粉含量,培育糯质型作物新品种^[23]。Visser 等^[24]、Salehuzzaman 等^[25]和 Kuipers 等^[8]利用反义 RNA 技术抑制了马铃薯块茎中 GBSS 的表达,发现直链淀粉含量减少,而支链淀粉含量显著升高。但由于采用反义 RNA 抑制技术获得的转基因植株中能够有效抑制靶标基因表达的植株的比例很小,仅为 3%~15%^[26];而采用 RNAi 技术,可引起靶基因 85%以上甚至 100%的沉默^[10],其抑制效率比单独应用正义或反义 RNA 强 10 倍以上^[27],因此利用 RNAi 技术在 RNA 水平抑制基因的表达成为一种高效的基因功能研究方法,已有大量研究证实 RNAi 可以特异性抑制特定基因的表达,成为研究基因功能的良好工具^[28-29]。

在农业上 RNAi 技术已发展成为控制病虫害^[30-31]、抗逆^[32]、提高作物品质^[12,33]、功能基因组研究及代谢途径分析^[11]的新方法。有关利用 RNAi 技术进行淀粉品质改良的报道较多,但主要集中在小麦、水稻、玉米、甘薯上,操作基因多为 *SBE*,还未见有利用 RNAi 技术沉默马铃薯块茎 GBSSI 基因的报道。本研究构建含有 GBSSI 基因保守序列的 RNAi 植物表达载体,有望提高马铃薯支链淀粉的

含量或者创造出纯支链淀粉的新种质资源。目前,我们准备转化淀粉含量较高的优良马铃薯材料,以便选育出高支链淀粉或纯支链淀粉的适宜加工的新型马铃薯品种。

4 结论

获得的马铃薯块茎 GBSSI 相似基因与已发表的 GBSSI 基因(GenBank 登录号为 X58453)序列相似性达 99.78%,其开放阅读框长 1 824 bp,编码 607 个氨基酸,存在蛋白激酶 C、酪氨酸蛋白激酶磷酸化、酪蛋白激酶 II 磷酸化、糖基化、酰胺化和酰基化等功能位点。该蛋白具有淀粉合成功能,基因序列已注册到 GenBank,序列登录号为 EU403426,以此为靶序列,选择 GBSSI 基因保守序列区的 542 bp 区段,构建了 Patatin 启动子驱动的干扰表达载体。

References

- [1] Yu T-F(于天峰), Xia P(夏平). Characteristic and use of the potato starch. *Chin Agric Sci Bull* (中国农学通报), 2005, 21(2): 55–58 (in Chinese with English abstract)
- [2] Nuessli J, Handschin S, Conde-Petit B, Escher F. Rheology and structure of amylopectin potato starch dispersions without and with emulsifier addition. *Starch-Stärke*, 2000, 52: 22–27
- [3] Wang Z-R(王中荣), Liu X(刘雄). Study on properties and application of high amylose starch. *Cereal & Oil* (粮食与油脂), 2005, 11: 10–13 (in Chinese with English abstract)
- [4] Xie B-X(谢碧霞), Zhong Q-P(钟秋平), Xie T(谢涛), Li A-P(李安平). Properties, application and development strategies of starch. *Nonwood For Res* (经济林研究), 2004, 22(4): 61–64 (in Chinese with English abstract)
- [5] Tsai C Y. The function of the waxy locus in starch synthesis in maize endosperm. *Biochem Genet*, 1974, 11: 83–96
- [6] James M G, Denyer K, Myers A M. Starch synthesis in the cereal endosperm. *Curr Opin Plant Biol*, 2003, 6: 215–222
- [7] Kuipers A G J, Jacobsen E, Visser R G F. Formation and deposition of amylose in the potato tuber starch granule are affected by the reduction of granule-bound starch synthase gene expression. *Plant Cell*, 1994, 6: 43–52

- [8] Kuipers G, Vreem J, Meyer H, Jacobsen E, Feenstra W, Visser R. Field evaluation of antisense RNA mediated inhibition of GBSS gene expression in potato. *Euphytica*, 1991, 59: 83–91
- [9] Jiang P-X(蒋培霞), Wang H-S(王海胜), Li Y-X(李艳霞), Ma X-D(马向东). The mechanism and application prospect of RNA interference (RNAi). *J Henan Agric Univ* (河南农业大学学报), 2004, 38(1): 64–67 (in Chinese with English abstract)
- [10] Smith N A, Singh S P, Wang M B, Stoutjesdijk P A, Green A G, Waterhouse P M. Gene expression: total silencing by intron-spliced hairpin RNAs. *Nature*, 2000, 407: 319–320
- [11] Matthew L. RNAi for plant functional genomics. *Comp Funct Genome*, 2004, 5: 240–244
- [12] Regina A, Kosar-Hashemi B, Ling S, Li Z, Rahman S, Morell M. Control of starch branching in barley defined through differential RNAi suppression of starch branching enzyme IIa and IIb. *J Exp Bot*, 2010, 61: 1469–1482
- [13] Otani M, Hamada T, Katayama K, Kitahara K, Kim S H, Takahata Y, Suganuma T, Shimada T. Inhibition of the gene expression for granule-bound starch synthase I by RNA interference in sweet potato plants. *Plant Cell Rep*, 2007, 26: 1801–1807
- [14] Zhang G, Cheng Z, Zhang X, Guo X, Su N, Jiang L, Mao L, Wan J. Double repression of soluble starch synthase genes SSIIa and SSIIIa in rice (*Oryza sativa* L.) uncovers interactive effects on the physicochemical properties of starch. *Genome*, 2011, 54: 448–459
- [15] Zhang J-L(张俊莲), Wang D(王蒂), Zhang J-W(张金文), Chen Z-H(陈正华). Modification of pBI121 vector and expression vector construction Na⁺/H⁺ antiporter of *Arabidopsis thaliana*. *Mol Plant Breed* (分子植物育种), 2006, 4(6): 811–818 (in Chinese with English abstract)
- [16] Sambrook J, Russell D W. Molecular Cloning: a Laboratory Manual, 3rd edn. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001. pp 305–320
- [17] Reynolds A, Leake D, Boese Q, Scaringe S, Marshall W S, Khvorova A. Rational siRNA design for RNA interference. *Nat Biotech*, 2004, 22: 326–330
- [18] Peng J-S(彭佳松), Zhao S-J(赵淑娟), Wu X-J(吴晓俊), Liu D(刘涤), Hu Z-B(胡之璧), Xu Z-A(许政皓). cDNA cloning and structural analysis of granule-bound starch synthase gene of hairy roots of *Astragalus membranaceus*. *Acta Bot Sin* (植物学报), 2000, 42(9): 940–945 (in Chinese with English abstract)
- [19] Dry I, Smith A, Edwards A, Bhattacharyya M, Dunn P, Martin C. Characterization of cDNAs encoding two isoforms of granule-bound starch synthase which show differential expression in developing storage organs of pea and potato. *Plant J*, 1992, 2: 193–202
- [20] Hammond S M, Bernstein E, Beach D, Hannon G J. An RNA-directed nuclease mediates post-transcriptional gene silencing in *Drosophila* cells. *Nature*, 2000, 404: 293–296
- [21] Li J-Y(李竞芸), Zhang G-H(张广辉), Wang S(王森). RNA interference and its applications on plant improvement. *Mol Plant Breed* (分子植物育种), 2007, 5(suppl-1): 145–148 (in Chinese with English abstract)
- [22] Burch-Smith T M, Miller J L, Dinesh-Kumar S P. PTGS approaches to large-scale functional genomics in plants. In: RNAi: a Guide to Gene Silencing. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003. pp 243–264
- [23] Li J-R(李加瑞), Zhao W(赵伟), Li Q-Z(李全梓), Ye X-G(叶兴国), An B-Y(安宝燕), Li X(李祥), Zhang X-S(张宪省). RNA silencing of waxy gene results in low levels of amylose in the seeds of transgenic wheat (*Triticum aestivum* L.). *Acta Genet Sin* (遗传学报), 2005, 32(8): 846–854
- [24] Visser R G F, Somhorst I, Kuipers G J, Ruys N J, Feenstra W J, Jacobsen E. Inhibition of the expression of the gene for granule-bound starch synthase in potato by antisense constructs. *Mol Gen Genet*, 1991, 225: 289–296
- [25] Salehuzzaman S N I M, Jacobsen E, Visser R G F. Isolation and characterization of a cDNA encoding granule-bound starch synthase in cassava (*Manihot esculenta* Crantz) and its antisense expression in potato. *Plant Mol Biol*, 1993, 23: 947–962
- [26] Hofvander P, Andersson M, Larsson C T, Larsson H. Field performance and starch characteristics of high-amylose potatoes obtained by antisense gene targeting of two branching enzymes. *Plant Biotechnol J*, 2004, 2: 311–320
- [27] Fire A X S, Montgomery M K, Kostas S A, Driver S E, Mello C C. Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in *Caenorhabditis elegans*. *Nature*, 1998, 391: 806–811
- [28] Ashrafi K, Chang F Y, Watts J L, Fraser A G, Kamath R S, Ahringer J, Ruvkun G. Genome-wide RNAi analysis of *Caenorhabditis elegans* fat regulatory genes. *Nature*, 2003, 421: 268–272
- [29] Frankish H. Consortium uses RNAi to uncover genes' function. *Lancet*, 2003, 361: 584
- [30] Wang X B, Wu Q, Ito T, Cillo F, Li W X, Chen X, Yu J L, Ding S W. RNAi-mediated viral immunity requires amplification of virus-derived siRNAs in *Arabidopsis thaliana*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2010, 107: 484–489
- [31] Sun Z N, Song Y Z, Yin G H, Zhu C X, Wen F J. HpRNAs derived from different regions of the Nlb gene have different abilities to protect tobacco from infection with potato virus Y. *J Phytopathol*, 2010, 158: 566–568
- [32] Golldack D, Lüking I, Yang O. Plant tolerance to drought and salinity: stress regulating transcription factors and their functional significance in the cellular transcriptional network. *Plant Cell Rep*, 2011, 30: 1383–1391
- [33] Wu L, Bhaskar P, Busse J, Zhang R, Bethke P, Jiang J. Developing cold-chipping potato varieties by silencing the vacuolar invertase gene. *Crop Sci*, 2011, 51: 981–990